

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'INTOXICATION AIGUE PAR LE PETROLE LAMPANT

A propos de 210 observations recueillis dans le service de réanimation
de l'Hopital d'El-Kettar du 1^{er} Janvier 1966 au 31 Décembre 1971

THESE

POUR LE DOCTORAT EN MEDECINE

présentée et soutenue publiquement le 30 Juin 1972

Par

HADJOU DJ Hachemi

né le 17 Avril 1945 à AZEFFOUN (Grande-Kabylie)

MEMBRES DU JURY

MM.	M. DRIF :	Professeur de clinique de Médecine Expérimentale	} PRESIDENT
	B. KHATI :	Professeur de clinique de Pédiatrie et Puériculture	
	M. KEBBOUCHE :	Professeur d'Hygiène, Hydrologie et Médecine Préventive	} JUGES
	J.F. GRANGAUD :	Maître de Conférences Agrégé (Pédiatrie - Puériculture)	

UNIVERSITE D'ALGER

FACULTE MIXTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

Année 1972 — N°

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'INTOXICATION AIGUE PAR LE PETROLE LAMPANT

A propos de 210 observations recueillis dans le service de réanimation
de l'Hopital d'El-Kettar du 1^{er} Janvier 1966 au 31 Décembre 1971

THESE

POUR LE DOCTORAT EN MEDECINE

présentée et soutenue publiquement le 30 Juin 1972

Par

HADJOU DJ Hachemi

né le 17 Avril 1945 à AZEFFOUN (Grande-Kabylie)

MEMBRES DU JURY

MM. M. DRIF :	Professeur de clinique de Médecine Expérimentale	} PRESIDENT
B. KHATI :	Professeur de clinique de Pédiatrie et Puériculture	
M. KEBBOUCHE :	Professeur d'Hygiène, Hydrologie et Médecine Préventive	} JUGES
J.F. GRANGAUD :	Maitre de Conférences Agrégé (Pédiatrie - Puériculture)	

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'INTOXICATION AIGUE PAR LE PETROLE LAMPANT

A propos de 210 observations recueillies dans le service de réanimation
de l'Hôpital d'El-Kettar du 1^{er} janvier 1966 au 31 Décembre 1971

THESE

POUR LE DOCTORAT EN MEDECINE

présentée et soutenue publiquement le 20 Juin 1973

Par

HADJOUJI Hachemi

né le 17 Avril 1945 à AZEFOUN (Ghardaïa-Népalia)



MEMBRES DU JURY

M. DIB	Professeur de clinique de Médecine Expérimentale	PRESIDENT
B. KHATI	Professeur de clinique de Pédiatrie et Pédiatrie	
M. KERBOUCHE	Professeur d'Hygiène, Microbiologie et Médecine Préventive	JURY
J.F. GRANGAUD	Maire de Constantine (Algérie - Pédiatrie)	

Serment d'Hippocrate

En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers condisciples et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la Médecine.

Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime.

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs pères.

Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères, si j'y manque.

JE DEDIE CETTE THESE

A Mon Père ,

A Ma Mère ,

Faible témoignage de ma grande
reconnaissance, et de mon effection pour
tous les sacrifices qu'ils ont consentis
pour nous .

A mes Frères et Soeurs .

A ma Femme ,

A mon Fils ,

A tous mes amis .

A NOTRE MAITRE ET PRÉSIDENT DE THÈSE :

MONSIEUR LE PROFESSEUR M. DRIF .

- Durant notre stage dans votre service,
nous avons pu bénéficier de votre enseignement, et
de votre grande expérience clinique.

Vous nous avez fait le grand honneur
de nous confier ce travail .

Vous n'avez ménagé, ni votre temps, ni
vos conseils pour son élaboration.

Vous nous faites le grand honneur de bien
vouloir présider notre thèse.

Nous voulons vous exprimer ici, nos sincères
remerciements, et notre profond respect.

//-))

N O S J U G E S

==*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=**

MONSIEUR LE PROFESSEUR B. KHATI,

Vous nous avez toujours accueilli avec
une extrême bonté.

Nous avons pu, lors de notre passage
dans votre service apprécier votre enseignement
et vos hautes qualités humaines.

Vous nous faites l'honneur de bien
vouloir juger notre travail.

Qu'il nous soit permis de vous exprimer
ici, notre reconnaissance et notre profond respect.

MONSIEUR LE PROFESSEUR M. KEBBOUCHE

Nous avons toujours apprécié la haute
valeur de votre enseignement magistral.

Vous avez accepté de nous honorer en
en comptant parmi les Membres de notre jury,

Nous vous prions de trouver là, l'expression
de nos vifs remerciements et de notre profond respect.

MONSIEUR LE PROFESSEUR J.P. GRANGAUD

La clarté de votre enseignement, votre
extrême bonté, ont suscité en nous une grande admiration.

Vous nous faites l'honneur de bien vou-
loir juger notre travail,

Nous vous prions de trouver là, l'expres-
sion de notre dévouement et de nos sincères remerciements.

A NOS MAITRES DE LA FACULTE ET EN PARTICULIER :

Monsieur Le Professeur B. AIT-OUYAHIA

Monsieur Le Professeur M.A. MERIOUA

Monsieur Le Professeur A. AIT-KHALED

Monsieur Le Professeur B. OULD-ROUIS

Monsieur Le Professeur P. ROCHE

Monsieur Le Professeur P. COLONNA

Madame Le Professeur R.M. HAMLADJI .

A Nos Aînés : Monsieur Le Docteur B. LALIAM

Monsieur Le Docteur R. DAQUD

Monsieur Le Docteur T. ROCHAS .

Au personnel Para-Médical des services PASTEUR et VIDAL
du C.H.U. D'EL-KETTAR .

II^o N T R O D U C T I O N

* = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = *

Le pétrole lampant est un produit de distillation du pétrole brut obtenu par chauffage entre 150 et 300 ° . Son usage est encore très répandu dans notre pays, aussi bien dans les zones rurales, que dans les villes où il est utilisé comme produit de chauffage, d'éclairage, et comme détachant.

- A partir de 210 observations de sujets hospitalisés dans le service de réanimation de l'Hôpital d'El-Kettar du 1er Janvier 1966 au 31 Décembre 1971 ,

- A partir des données de la littérature, ce travail est une mise au point concernant, une intoxication fréquente :

L'intoxication par le Pétrole lampant.

Ce travail comporte deux parties:

I / L'étude de l'intoxication aiguë , par le pétrole lampant à la lumière des données de la littérature.

II/ L'étude analytique de nos observations.

I - E T U D E D U T O X I Q U E

Le pétrole brut est un mélange complexe d'hydrocarbures gazeux, liquides et solides, formés, comme leur nom l'indique de carbone et d'hydrogène, associés en proportions très variables.


Ainsi s'explique l'extraordinaire variété des pétroles et de leurs propriétés.

A / Classification-Propriétés Chimiques.


Les hydrocarbures du pétrole peuvent être rangés en 3 grandes catégories :

1 - Les hydrocarbures acycliques saturés ou paraffiniques, de formule générale $C_n H_{2n+2}$, dont les premiers termes sont le méthane (CH_4), l'éthane ($C_2 H_6$), le propane ($C_3 H_8$), le butane ($C_4 H_{10}$). ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$).

2 - Les hydrocarbures cycliques saturés ou naphténiques, de formule générale $C_n H_{2n}$, tels que le cyclopentane ($C_5 H_{10}$), le cyclo-hexane ($C_6 H_{12}$).



3 - Les hydrocarbures cycliques non saturés ou aromatiques, de formule générale $C_n H_{2n-6}$, tels que le benzène ($C_6 H_6$), le toluène ($C_7 H_8$).



4 - A côté des corps de ces 3 séries, les plus fréquemment rencontrés parmi les pétroles, on trouve également, des hydrocarbures acycliques non saturés appelés éthyléniques, des hydrocarbures non saturés diéthyléniques, des hydrocarbures non saturés acéthyléniques ($C_n H_{2n-2}$).

Ainsi les pétroles sont classés en 3 groupes principaux:

- Les pétroles paraffiniques très répandus
- Les pétroles naphténiques rares.
- Les pétroles mixtes également très répandus.

Tous contiennent des hydrocarbures aromatiques, mais en proportion généralement faible. En outre, ils renferment :

- De l'azote à l'état libre, ou sous forme de composés organiques .

- De l'oxygène dans les acides naphténiques.

- Du soufre, des impuretés minérales parmi lesquelles: le calcium, le magnésium, le silicium, l'aluminium, le fer et le nickel.

B / PROPRIETES PHYSIQUES.

Les pétroles naturels sont variables sur les plans physique et chimique.

Le pétrole brut est facilement soluble dans les solvants organiques il dissout: les graisses, les résines, le soufre.

.../...

Sa densité varie de 0,75 à 0,82 (Unités A.P.I. American Petroleum Institute)

Certaines variétés (Mexique, Venezuela, Sicile, ou Egypte.) ont une densité légèrement inférieure à 1 (10° A.P.I.); d'autres sont très légers comme le pétrole d'Hassi-Messaoud ($D = 0,80 / 45^{\circ}$ A.P.I.).

Sous l'action de la chaleur, les pétroles lourds se vaporisent, leur point d'ébullition variant selon qu'il s'agisse de composés légers ou lourds.

C / PRODUITS DE DISTILLATION.

Selon la température, les composés obtenus sont:

- Jusqu'à 35°, des gaz incondensables (méthane, butane.).
- De 35° à 70°, les éthers du pétrole (pentane, hexane.).
- De 70° à 80°, le benzène.
- De 80° à 150°, les essences spéciales utilisées dans l'aviation, l'automobile, et le dégraissage.
- De 150° à 300°, les pétroles lampants ou huiles de pétrole utilisés pour l'éclairage, le nettoyage, le chauffage.
- De 250° à 350°, le Gaz-Oil, utilisé surtout comme carburant. Après arrêt de la distillation, le résidu qui persiste, s'appelle Fuel-oil ou mazout.

Ces dernières années, à cause de la consommation de plus en plus importante, des essences et des pétroles lampants sont obtenus par la méthode du "Cracking", à partir du Gaz-oil et du Fuel-oil; procédé qui consiste à briser les grosses molécules des hydrocarbures lourds, par chauffage à haute température en présence d'un agent catalyseur.

.../...

D/ TOXICITE DU PETROLE ET DE SES DERIVES.

LEGLUDIC et TURBLAIS démontrent que la toxicité du pétrole augmente avec l'évaporation, à cause de l'augmentation de la densité de ses distillés. Ces propriétés toxiques ont été mises en évidence par l'expérimentation, qui note:

1 - des propriétés anesthésiques aux hydrocarbures paraffiniques et éthyléniques.

2 - des propriétés narcotiques aux hydrocarbures naphténiques; mais, le pétrole est d'autant plus toxique qu'il est plus riche en hydrocarbures aromatiques.

- Le benzène est un corps très toxique, entraînant localement des troubles cutanés : érythèmes, brûlures, une atteinte du système nerveux central (excitation suivie de dépression.)

Une atteinte de la moëlle osseuse et du sang périphérique, avec: anémie, leucopénie, et thrombocytopénie.

- La toxicité du pétrole peut être encore accrue si le pourcentage de soufre, de phosphore et d'impuretés minérales est élevé.

Dans ce travail le terme de pétrole lampant désigne un produit obtenu par distillation du pétrole brut, entre 150 et 300° .

.../...

II - FREQUENCE DE L'INTOXICATION

Ce sont surtout les travaux Américains qui ont fait connaître les pneumopathies du pétrole chez l'enfant.

Le premier cas rapporté fut celui de HAMILTON
("Medical News" en 1897 .)

En 1962, un rapport du sous-comité de l'académie Américaine de pédiatrie (cité par BRUCE M. & Coll.) fait état d'une incidence annuelle de 28.000 cas avec 83 décès, des intoxications accidentelles par le pétrole lampant. Les enfants de moins de 5 ans, représentent 90 % de ce nombre.

Durant la période de 1951 à 1958 , 763 personnes ont trouvé la mort aux U.S.A. à la suite de l'absorption accidentelle de pétrole.

D'après FOLERY, les cas d'intoxication par ingestion accidentelle de pétrole représentent 40 % des admissions d'enfants au-dessous de 2 ans pour "accident survenu à la maison".

Durant la même période (1951 à 1958.) BALDACHIN & Coll. rapportent 200 cas d'intoxication par ingestion de pétrole, en Afrique du Sud.

La moyenne d'âge des sujets intoxiqués étant de 19 mois, la tranche d'âge de 5 mois à 5 ans représentant la majorité, la publication ne comportant que 3 cas d'intoxication chez des adultes.

Dans une statistique portant sur 834 enfants de moins de 5 ans intoxiqués accidentellement BAIN cite le pétrole lampant comme responsable de 25 % de ces accidents.

.../...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

TO THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
FROM THE DEAN OF THE FACULTY
SUBJECT: A REPORT ON THE PROGRESS OF THE FACULTY
DURING THE YEAR 1900-1901

The Faculty of the University of Chicago
has the honor to acknowledge the receipt of
your letter of the 10th inst. and to inform
you that the same has been forwarded to the
proper authorities for their consideration.

The Faculty of the University of Chicago
has the honor to acknowledge the receipt of
your letter of the 10th inst. and to inform
you that the same has been forwarded to the
proper authorities for their consideration.

The Faculty of the University of Chicago
has the honor to acknowledge the receipt of
your letter of the 10th inst. and to inform
you that the same has been forwarded to the
proper authorities for their consideration.

The Faculty of the University of Chicago
has the honor to acknowledge the receipt of
your letter of the 10th inst. and to inform
you that the same has been forwarded to the
proper authorities for their consideration.

The Faculty of the University of Chicago
has the honor to acknowledge the receipt of
your letter of the 10th inst. and to inform
you that the same has been forwarded to the
proper authorities for their consideration.

The Faculty of the University of Chicago
has the honor to acknowledge the receipt of
your letter of the 10th inst. and to inform
you that the same has been forwarded to the
proper authorities for their consideration.

III - E T U D E C L I N I Q U E

L'intoxication aigüe par le pétrole évolue généralement en 2 phases:

- une phase de début: au cours de laquelle sont notées des manifestations immédiates dues à l'action irritative du produit.

- une phase d'état, survenant après une accalmie de durée variable, qui est marquée par la survenue des manifestations viscérales, neurologiques et surtout pulmonaires.

A / PHASE DE DEBUT .

Dès l'ingestion du pétrole l'enfant présente des signes respiratoires: Toux, suffocation, parfois asphyxie avec cyanose.

Simultanément, apparaissent des troubles digestifs: nausées, vomissements, douleurs abdominales; enfin, dans certains cas, un tableau de choc peut apparaître, évoluant rarement d'un seul tenant vers la mort.

Le plus souvent, une phase d'accalmie survient, avec diminution des phénomènes irritatifs pulmonaires, une somnolence peut apparaître (49 % des malades de PRESSE) 8 % des malades de cette même série présentèrent un coma et 1 % des convulsions.

B / PHASE D'ETAT.

I - LES MANIFESTATIONS PULMONAIRES

a) Clinique.

Si ces manifestations surviennent dans 40 % des cas, d'intoxication par le pétrole, le tableau clinique n'est pas toujours évocateur.

.../...

Un certain nombre de malades, en effet, ne présentent pas de signes fonctionnels ou physiques respiratoires, et seule la radiographie permet de découvrir l'atteinte pulmonaire (27% des malades de BALDACHIN).

Le tableau pulmonaire lorsqu'il existe, apparaît 1 à 4 heures après l'ingestion du produit.

L'enfant présente une dyspnée, une toux, une cyanose discrète peut apparaître, ainsi qu'une expectoration spumeuse, voire hémorragique.

La température, modérée généralement est présente dans 97 des 200 cas de BALDACHIN. Elle s'élève généralement 24 heures après l'ingestion, la durée de cette pyrexie est variable, et semble sans relation avec la gravité de l'état.

L'examen clinique au cours de cette phase, est plus ou moins parlant :

Parfois, il existe un syndrome de condensations typique, ailleurs les signes sont plus discrets.

Rarement sont rencontrés des signes pleuraux. Les épanchements pleuraux, rares, sont généralement peu abondants, se constituant rapidement. Le liquide retiré à la ponction est séro-fibrineux, louche, ou séro-hématique, aseptique, de formule bigarrée.

Leur évolution est bénigne, et ces épanchements guérissent en 2 à 3 semaines.

De ces complications, la pneumonie typique reste de loin la plus fréquente puisqu'elle est retrouvée dans 50 à 80 % des cas.

.../...

b) Radiologie des Lésions Pulmonaires.

La radiologie est l'élément essentiel, puisque l'atteinte radiologique peut exister en l'absence de signes cliniques.

Les signes radiologiques sont précoces dans leur apparition, survenant très tôt après l'ingestion du pétrole.

Les atteintes radiologiques prédominant à droite, dans la grandemajorité des cas, ce qui semble dû à la disposition anatomique de l'arbre bronchique.

Les images habituellement rencontrées, sont de type variable.

- Accentuation de la trame broncho-vasculaire,
- Opacités nuageuses de l'angle cardio-phrénique,
- Images de broncho-pneumonie typique,
- Atélectasie segmentaire.

Plus rarement est notée une atteinte pleurale , généralement discrète (1/46 examens radiologiques selon BRUNNER).

- L'évolution radiologique se fait, dans la plupart des cas, en 10 à 15 jours vers la rétrocession, probablement influencée par les antibiotiques.

- Dans certains cas, l'évolution est marquée par l'apparition au sein d'un foyer de condensation, d'images claires.

Ces images d'abord petites, s'étendent, leurs parois s'amincissent. Leur évolution relativement longue, s'étend sur plusieurs semaines ou mois, aboutissant à la restitution "Ad-Integrum" du parenchyme.

Exceptionnellement elles peuvent se rompre entraînant la formation d'un pneumothorax.

c) L'Evolution des Complications Pulmonaires

L'évolution de ces complications est le plus souvent favorable, hâtée par le traitement antibiotique.

Les signes cliniques rétrocedant généralement avant les signes radiologiques.

L'évolution peut se faire suivant le mode sub-aiguë ou chronique, avec possibilité de séquelles bronchique à type de D.D.B. ou, de séquelles pleurales.

Des abcès du poumon, et des pneumatocèles surtout, ont été rapportés dans de nombreuses publications. Les bulles se formant en moins de 15 jours ; leur résorption est toujours longue (2 à 22 mois.), pouvant se compliquer de pneumothorax. Leur formation serait secondaire à l'extension d'un foyer initial, sous l'effet des phénomènes de tension élastique intra-parenchymateux. La mort est une issue rare, 1/200 (BALDACHIN) 83/28.000 (U.S.A.).

Survenant dans un tableau d'O.A.P. ou de coma avec troubles neuro-végétatifs majeurs.

II- LES MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES.

Les manifestations neurologiques, d'intensité et de gravité variable, sont notées par de nombreux Auteurs.

Les signes le plus souvent notés sont les suivants:

a) Les convulsions :

Les convulsions sont retrouvées en moyenne dans 1 % des cas. Il s'agit rarement de convulsions isolées, et elles surviennent le plus souvent dans un contexte neurologique grave .

.../...

b) - le coma .

- Le coma reste une éventualité rare. Il est l'apanage des formes sévères, survenant chez de très jeunes enfants, aboutissant le plus souvent à la mort.

Les convulsions et les troubles neuro-végétatifs avec coma, sont les formes majeures des manifestations neurologiques et sont retrouvées dans peu de cas .

A l'opposé, les altérations mineures de la conscience, à type de somnolence, d'abattement, sont assez fréquemment rencontrées, et ce , assez précocément après l'ingestion du pétrole.

Ces manifestations sont par ailleurs, bénignes sur le plan évolutif. La guérison de règle, est obtenue sans séquelles, en 24 à 48 heures dans la grande majorité des cas.

MOZICONACCI décrit une polyradiculo-névrite, avec dissociation albumino-cytologique, au 23ème jour , chez un de ses malades.

III- LES MANIFESTATIONS RENALES.

- des atteintes rénales ont pu être rapportées, dans certains cas, en effet, ont été signalées:

- une albuminurie: généralement peu importante et éphémère.

- une cylindrurie et une hématurie: Très exceptionnellement, une pétrolurie a été rapportée par GOUIRIC. (cité par CAMUS.).

.../...

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

IV - LES TROUBLES HEMATOLOGIQUES.

- La N.F.S. montre souvent, une leucocytose avec polynucléose neutrophile, tandis que l'on retrouve parfois une légère anémie.

- VICARIOT rapporte le cas d'un enfant qui présenta un purpura thrombopénique.

Toutes ces manifestations hématologiques sont toutefois, transitoires, et bénignes quant à leur évolution.

V - LES MANIFESTATIONS HEPATIQUES.

- L'atteinte hépatique vraie, est rarement retrouvée dans la littérature. Cependant, une hépatosplénomégalie modérée a pu être décrite, RAMON-GUERRA retrouve chez quelques uns de ces malades, une bilirubinurie transitoire .

VI - LES COMPLICATIONS CARDIAQUES.

- La tachycardie est fréquente au début, mais de peu de valeur.

- En fait, les vraies complications sont rares : STEINER rapporte 3 cas de cardiomégalie, et un cas de flutter auriculaire.

VII - LE PRONOSTIC.

- Le pronostic d'ensemble de ces complications et, d'une manière plus générale, des intoxications par ingestion de pétrole lampant, reste favorable.

- Les taux de décès sont très variables; lorsque des accidents graves surviennent, ils se produisent généralement dans les premières heures.

Le décès survenant, soit dans un tableau d'O.A.P. soit dans un tableau de coma avec troubles neuro-végétatifs majeurs.

IV - LES TROUBLES HEMATOLOGIQUES.

- La N.F.S. montre souvent, une leucocytose avec polynucléose neutrophile, tandis que l'on retrouve parfois une légère anémie.

- VICARIOT rapporte le cas d'un enfant qui présenta un purpura thrombopénique.

Toutes ces manifestations hématologiques sont toutefois, transitoires, et bénignes quant à leur évolution.

V - LES MANIFESTATIONS HEPATIQUES.

- L'atteinte hépatique vraie, est rarement retrouvée dans la littérature. Cependant, une hépatosplénomégalie modérée a pu être décrite, RAMON-GUERRA retrouve chez quelques uns de ces malades, une bilirubinurie transitoire .

VI - LES COMPLICATIONS CARDIAQUES.

- La tachycardie est fréquente au début, mais de peu de valeur.

- En fait, les vraies complications sont rares : STEINER rapporte 3 cas de cardiomégalie, et un cas de flutter auriculaire.

VII - LE PRONOSTIC.

- Le pronostic d'ensemble de ces complications et, d'une manière plus générale, des intoxications par ingestion de pétrole lampant, reste favorable.

- Les taux de décès sont très variables; lorsque des accidents graves surviennent, ils se produisent généralement dans les premières heures.

Le décès survenant, soit dans un tableau d'O.A.P. soit dans un tableau de coma avec troubles neuro-végétatifs majeurs.

IV - P H Y S I O - P A T H O L O G I E

La pathogénie des manifestations pulmonaires au cours de l'intoxication par ingestion de pétrole lampant, a longtemps soulevé, et soulève encore, de multiples controverses. Les avis demeurant encore toujours partagés.

De nombreux travaux expérimentaux, en particulier Américains constituent la base de nos connaissances actuelles.

Deux hypothèses ressortent de ces expériences:

- Pour certains Auteurs, les complications pulmonaires sont dûes à l'aspiration du pétrole, directement dans les poumons; soit au cours des vomissements immédiats, soit après inhalation brusque du produit, par l'enfant, surpris par le mauvais goût du liquide. lors de l'ingestion, soit après tubage gastrique mal conduit .

- Pour d'autres, la survenue des accidents pulmonaires, s'explique par le transport par voie sanguine, jusqu'aux poumons, du toxique absorbé au niveau des muqueuses digestives.

Enfin, certains, admettent la conjonction des deux mécanismes avec prépondérance toutefois du premier.

I/ THEORIE DE L'INHALATION.

(Pneumonie d'Inhalation)

C'est en fait la théorie qui réunit le plus de suffrages, de nombreuses expériences viennent appuyer cette première théorie. WARING, en 1933, après administration par voie gastrique de 250 ml. de pétrole lampant chez le chien, et exclusion de l'oesophage, montre l'absence de modifications radiologiques pulmonaires chez ces animaux; par ailleurs, aucun des animaux utilisés ne mourut.

.../...

A l'opposé, l'administration de 10 ml. de pétrole par voie endo-trachéale, provoque rapidement l'apparition de dyspnée, dépression respiratoire et décès. LESSER & Coll. en 1943, réalisent des expériences similaires, en utilisant des lapins. L'administration par voie intra-gastrique, de doses variables de pétrole (16 à 38 ml./kg) est suivie d'examens radiographiques qui ne révèlent pas de modifications significatives. Par ailleurs, à l'autopsie, l'aspect macroscopique des poumons est tout à fait normal.

Voici, relaté à titre d'exemple le protocole expérimental suivi par WOLFE & Coll. communiqué dans le "Journal of Pediatrics" (Juin 1970).

- Le matériel d'étude est représenté par des chiens :

- une anesthésie par le pentobarbital est réalisée. Puis les Auteurs procèdent à une dissection de l'oesophage cervical, en respectant les structures adjacentes. La dissection est suivie d'une section de l'oesophage et d'une suture de l'extrémité distale. Puis est réalisé un abbouchement de l'extrémité proximale à la peau.

Les animaux, sont nourris grâce à des injections sous-cutanées d'une solution de RINGER additionnée de dextrose à 2,5 %, et ce, pour prévenir l'apparition d'une éventuelle déshydratation.

Après cette intervention, les animaux sont soumis à un traitement antibiotique préventif (Pénicilline-Streptomycine.)

Deux jours après l'intervention initiale, on instille le pétrole lampant directement dans l'estomac des animaux à l'aide d'une seringue (un des animaux reçoit, à titre de contrôle du sérum salé à la place du pétrole.).

.../...

Les autres chiens reçurent respectivement, 5,5,10, 10,20, et 30 ml. de pétrole (Un des animaux mourut lors de l'anesthésie.).

Il fut procédé à une radiographie pulmonaire chez tous les animaux, une heure avant l'administration du pétrole, et ensuite, 12, 24, 48, 96 heures après.

Deux animaux furent sacrifiés au 5ème jour, les autres le furent au 4ème jour. Chez les animaux dont les poumons ne présentaient aucune anomalie macroscopique, Les Auteurs prélèvent la partie périphérique du lobe moyen droit qui est soumis à un examen histologique.

Lorsque les poumons présentaient des anomalies macroscopiques, l'examen histologique portait alors sur la zone la plus lésée.

Les Auteurs, concluent à l'issue de leur expérience, que: L'administration intra-gastrique de pétrole lampant chez des chiens, ne provoque pas l'apparition de lésions pulmonaires significatives.

Par contre, l'administration intra-trachéale de 0,75 à 2 ml. de pétrole; produit des modifications radiologiques, et histologiques caractéristiques (oedème, congestion, hémorragies.).

Les travaux de FOLEY & Coll. en 1954 , de GERARDE en 1959, basés sur les mêmes principes, aboutissent aux mêmes conclusions.

REED & Coll. obtiennent constamment des pneumopathies chez des lapins soumis à des aérosols de pétrole.

.../...

Les expériences de GIAMMONA confirment le rôle de l'aspiration dans le déterminisme des accidents pulmonaires:

Après injection de dérivés de pétrole par voie intraveineuse, endo-trachéale et intra gastrique à des chiens et à des rats, cet Auteur extrait, des pièces anatomiques, le surfactant pulmonaire, et étudie la tension superficielle des extraits.

Si après injection intra-veineuse, ou endo-trachéale la tension superficielle minima des extraits pulmonaires et élevée, il n'en est rien chez des animaux ayant reçu du pétrole par voie gastrique .

On peut donc conclure que les lésions pulmonaires sont secondaires au contact physique direct du produit avec les bronchioles ou les alvéoles.

Ce contact se produit, soit lors de l'ingestion, soit lors des vomissements spontanés ou provoqués.

La fréquence des pneumopathies suivant l'existence ou non des vomissements est un autre argument en faveur d'un tel mécanisme; cette fréquence, de 49 % lorsqu'ils existent, est de 34 % lorsqu'ils sont absents.

II - THEORIE DE L'ABSORPTION DIGESTIVE.

(Pneumonie d'Elimination)

DEICHMANN & Coll. en 1944 dans leurs expériences sur des lapins, des cobayes et des rats, montre que, des lésions pulmonaires peuvent survenir, quelle que soit la voie d'administration du pétrole. (Gastrique, Intra-veineuse, intra-péritonéale.).

Ces expériences ayant lieu après exclusion préalable du circuit trachéal, les Auteurs concluent que les lésions pulmonaires, ne sont pas dues seulement à l'aspiration trachéale, mais à l'élimination secondaire du toxique au niveau du poumon où il arrive par voie sanguine.

.../...

STEINER, en 1947, RICHARDSON en 1951, aboutissent aux mêmes conclusions à la suite de leurs expériences.

DIDIER quant à lui, (1948) tout en admettant l'importance de l'aspiration directe du produit dans l'arbre respiratoire, insiste sur l'importance de la participation du système nerveux végétatif dans la pathogénie des manifestations pulmonaires, l'intensité des signes observés n'étant souvent pas en rapport avec la faible quantité de liquide absorbé. Celui-ci, agirait comme stimulant direct sur la muqueuse bronchique, entraînant ainsi des modifications au niveau de tous les éléments constitutifs du poumon, avec modification du tonus de la musculature de l'appareil pulmonaire, et variation de la perméabilité des capillaires sous-pleuraux.

GUERRA, en 1956, met en relief l'importance des propriétés physiques du toxique dans la genèse des troubles respiratoires :

Les substances huileuses, parcourent l'arbre respiratoire, d'autant plus vite que leur viscosité est plus basse. Ainsi, les mécanismes protecteurs du larynx sont très vite dépassés. Le spasme et la toux, sont des mécanismes protecteurs qui sont en général postérieurs au passage du produit dans le larynx, et ils n'existent que dans les premières parties de l'arbre respiratoire. Le liquide aspiré est séquestré dans l'alvéole ("trappe alvéolaire"), puis apparaissent les réactions fonctionnelles et anatomiques. Néanmoins, une petite partie du toxique peut être rapidement absorbée, expliquant les troubles immédiats observés, en particulier les troubles neurologiques.

- En résumé, ces travaux expérimentaux, permettent de dégager les notions suivantes :

.../...

- Importance des propriétés physico-chimiques du pétrole, le rôle du système neuro-végétatif, et la susceptibilité particulière de l'enfant, expliquant la physiopathologie de cette intoxication qui associe:

- Une atteinte dépressive du S.N.C. due à l'absorption du toxique par voie trans-alvéolaire.

- L'agression directe du toxique sur tout l'arbre respiratoire, l'absorption digestive étant un phénomène d'importance secondaire.

V - ANATOMIE - PATHOLOGIQUE

A / LESIONS PULMONAIRES ET BRONCHIQUES.

" Les lésions observées, consistent en un oedème hémorragique et une broncho-pneumonie aigüe.

I - MACROSCOPIE.

Les poumons ont une couleur rouge violacée, congestive, l'arbre trachéo-bronchique est plein d'un liquide séro-hématique, mousseux.

II- MICROSCOPIE

Les alvéoles renferment un liquide de type exsudatif, riche en cellules inflammatoires. Les parois alvéolaires ont un aspect très congestif, les capillaires pariétaux sont très distendus.

La fibrine peut former une membrane hyaline, tapissant par endroits la paroi alvéolaire. Ces lésions sont parfois importantes au point de modifier l'architecture alvéolaire.

La coupe met en évidence, des foyers de condensation péri-bronchiques et péri-bronchiolaires. Ces lésions peuvent confluer, des zones d'atélectasie apparaissent alors, entourées de zones d'emphysème compensatrices.

Des ruptures pariétales peuvent se produire, dues aux lésions inflammatoires, et à la surtension alvéolaire, entraînant parfois un emphysème sous-cutané. Les bronches et les bronchioles sont le siège de phénomènes inflammatoires intenses, avec, par endroits, des plaques de nécrose ou des ulcérations. De même l'épithélium de la trachée et des grosses bronches peut être atteint.

.../...

B / LES AUTRES LESIONS.

- DEICHMANN, dans ses expériences, montre, l'existence, outre les lésions pulmonaires, d'altérations discrètes des reins, du myocarde, et une érosion de la muqueuse colique.

En fait, les études nécropsiques sont rares mais retrouvent les mêmes lésions que celles produits expérimentalement chez les animaux .

DEUXIEME PARTIE

Etude analytique des observations recueillies dans
le service de Réanimation de l'Hôpital d'El-Kettar.

Cette deuxième partie comprend les chapitres suivants:

I - UNE ETUDE ETIOLOGIQUE GLOBALE.

II - UNE ETUDE CLINIQUE.

III- UNE ETUDE RADIOLOGIQUE.

IV - UNE ETUDE THERAPEUTIQUE.

*

*

*

I - ETIOLOGIE.

Dans ce chapitre, seront envisagés successivement, les facteurs suivants:

1 - La fréquence de l'intoxication.

2 - Le sexe .

3 - L'âge .

4 - La répartition saisonnière.

Dans cette étude, il est fait mention, de 210 cas : que nous allons analyser; les pourcentages exprimés ici, ne sont, que relatifs, à nos cas.


I - LA FREQUENCE .

- Durant la période allant du 1er Janvier 1966, au 31 Décembre 1971, 210 cas d'intoxication aigüe par le pétrole lampant, ont été colligés dans le service de réanimation de l'hôpital d'El-Kettar.

Tous les malades hospitalisés sont originaires d'Alger ou de sa proche banlieue, aussi, ces malades ne sont qu'un reflet infidèle de la fréquence réelle de l'intoxication dans notre pays, qui est certainement beaucoup plus élevée.

Par ailleurs, il est fort probable que bon nombre de sujets présentant une forme mineure de l'intoxication, ne sont pas vu à l'hôpital.

- Ce chiffre de 210 cas pour une période de six années, (soit une moyenne annuelle de 35 cas.) est certainement en deçà de la réalité .



II - LE S E X E.

Les 210 malades hospitalisés pendant une période de six ans, se répartissent comme suit :

- 129 malades sont de sexe masculin (61,4 %).
- 81 sont de sexe féminin (38,6 %).

S'il existe une nette prédominance masculine, celle-ci est peu significative, si l'on considère l'âge de ces malades.

En effet, la plupart de nos malades sont de très jeunes enfants, voire des nourrissons, et la prédominance masculine, ne peut être considérée comme caractéristique dans ces tranches d'âge.

S E X E	NOMBRE DE CAS	POURCENTAGE
Masculin	129	61,4 %
Féminin	81	38,6 %

III- L'AGE . (Tableaux II et III.)

- La plus grande partie des malades hospitalisés dans le service pour intoxication aiguë par le pétrole lampant, est constituée par des enfants.

En effet, cette étude ne comporte que 8 cas d'intoxication chez l'adulte, ces malades ayant ingéré le pétrole dans un but suicidaire .

La majorité des malades se situe dans la tranche d'âge allant de 19 mois à 3 ans, (97 cas, soit 46,1 %).

Tandis que, dans la tranche de 13 à 18 mois, on retrouve 61 cas soit 29 % des malades. Ces deux tranches d'âge groupent donc la majorité des malades (158 cas soit plus de 75 % des malades.).


- L'intoxication aiguë par le pétrole lampant, est donc rencontrée avec prédilection chez le jeune enfant; le produit étant le plus souvent, abandonné à sa portée, dans un récipient ou un flacon anonyme.

REPARTITION DES CAS EN FONCTION DE L'AGE

De L'âge. (Tableau II.).

A G E	N O M B R E	POURCENTAGE
0 - 6 mois	0	
7 - 12 mois	17	8 %
13- 18 mois	61	29 %
19- 3 ans	97	46,1 %
4 - 6 ans	21	10 %
7 - 10 ans	5	2,3 %
11 - 15 ans	1	0,4 %
16 - 35 ans	8	3,8 %

REPARTITION EN FONCTION DE L'AGE (I - III)



IV - REPARTITION SAISONNIERE.

(Tableau IV).


L'étude des 210 dossiers montre, que le maximum de fréquence, annuellement et globalement, se situe au cours des mois de Juillet et d'Août (respectivement, 43 et 39 cas parmi les 210 sujets).

S A I S O N S	!	H I V E R	!	P R I N T E M P S	!	E T E	!	A U T O M N E
Nombre de cas	!	24	!	44	!	94	!	48

REPARTITION SAISONNIERE . (Tableau IV)

ANNEES	J.	F.	M.	A.	M.	J.	J.	A.	S.	O.	N.	D.
1966	1	4	2	3	2	1	7	9	3	5	0	2
1967	3	1	3	2	5	1	8	8	4	5	4	6
1968	1	2	2	1	3	2	8	2	2	2	1	1
1969	0	0	7	1	1	2	6	7	5	3	0	1
1970	1	1	1	1	5	5	8	3	1	2	2	2
1971	0	0	0	1	4	1	6	10	5	3	1	0
TOTAL	6	8	15	9	20	12	43	39	20	20	8	10
							43	39				

nombre



II - E T U D E C L I N I Q U E.

=====

Dans ce chapitre, seront successivement envisagés:

A - Les signes cliniques observés à l'entrée.

B - L'évolution clinique .

C - Les résultats.

*

*

*

A - LES SIGNES CLINIQUES OBSERVES A L'ENTREE DU MALADE.

Parmi les 210 malades hospitalisés dans le service de réanimation de l'hôpital d'El-Kettar de 1966 à 1971 ,

- 77 malades ont ingéré le produit, dans les heures précédant leur admission.

- 36 malades ont ingéré le produit la veille.

- dans 15 cas, l'ingestion remonte à plus de 24 heures.

- Enfin, dans 82 cas, le moment de l'ingestion n'a pu être déterminé.

LES SIGNES CLINIQUES .

I - SIGNES RESPIRATOIRES.

-Les signes respiratoires, sont le plus souvent, retrouvés à l'entrée des malades, ceci pourrait s'expliquer par le fait que, lors de l'ingestion du pétrole, le sujet, le plus souvent très jeune, est surpris par le goût du liquide, une partie de celui-ci, passe alors directement dans la trachée et les bronches.

Les signes respiratoires, d'une manière générale, sont retrouvés à l'entrée dans 113 cas, soit chez 53,7 % des malades.

Ce sont ces signes, de survenue quasi-immédiate, qui amènent les parents à conduire leurs enfants à l'hôpital dans les premières heures.

a/ Les Signes fonctionnels respiratoires.

- La Toux.

La toux a été notée à l'entrée, chez 32 malades. Cette toux, irritative, est le plus souvent quinteuse, parfois émétiqante , coqueluchoïde .

.../...

- La Dyspnée.

La dyspnée est retrouvée à l'entrée des malades dans 73 cas. Il s'agit en général, d'une dyspnée modérée, à type de polypnée, s'accompagnant de tirage intercostal et sus-sternal, avec battement des ailes du nez.

- L'encombrement bronchique

L'encombrement bronchique, retrouvé dans 30 cas à l'entrée, est le témoin de la bronchorrhée réactionnelle, face à l'agression du toxique sur les muqueuses respiratoires.

- La cyanose.

Elle est retrouvée chez 5 des malades de cette série.

Il s'agit le plus souvent d'une cyanose discrète, de siège péri-buccal, ou unguéal . Cependant, dans quelques cas, il existait une cyanose très importante, survenant dans un tableau de défaillance circulatoire et respiratoire aiguë (2 cas).

b / Les signes Physiques Respiratoires à l'entrée.

Dans cette série de malades, des signes physiques respiratoires ont été notés à l'entrée, dans 33 cas, traduisant l'existence d'une pneumopathie. Il s'agit, suivant les cas, de râles crépitants ou sous-crépitanants (8 cas). Le plus souvent, de râles sibillants, ou de râles bronchiques.

Dans quatre cas, il existait un syndrome clinique de condensation, qui associait, outre des râles crépitants, une sub-matité, voire une matité franche.

Dans tous ces cas, il s'agissait d'enfants ayant ingéré le pétrole, plus de 24 heures auparavant.

.../...

II - LES SIGNES GENERAUX.

a / - La pâleur.

- Ce signe est retrouvé dans 33 cas, il s'agit, le plus souvent d'enfants présentant en outre une toux et une dyspnée.

b / - L'hyperthermie.

- Elle est retrouvée chez 46 malades, soit dans 21,9 % des cas. Dans 30 cas, il s'agit d'enfants ayant ingéré le pétrole 24 heures ou plus, avant l'admission.

Modérée en général, (37°8 - 38°5) elle peut être assez importante: 40° voire 41 °. Dans cinq cas, enfin, cette hyperthermie est retrouvée à l'état isolé, sans autre anomalie clinique.

III- LES SIGNES NEUROLOGIQUES.

- Les signes neurologiques retrouvés à l'entrée sont d'intensité et de gravité variable , allant de la simple torpeur, aux convulsions avec sub-coma, voire coma.

D'une manière générale, ils sont retrouvés chez 49 malades soit dans 23,8 % des cas.

a / Les convulsions.

Parmi les 210 malades des convulsions ont été relevées 3 fois. (1,45 %.).

Dans deux cas, il s'agit d'un véritable état de mal convulsif, avec troubles neuro-végétatifs majeurs. Dans le troisième cas, l'épisode convulsif, bref, initial, a été sans lendemain.

.../...

b / L'obnubilation, La Torpeur.

43 malades ont présenté à leur admission, une diminution de leur niveau de conscience. Cette somnolence faisant place par moments à des phases d'agitation.

A un degré plus important, il s'est agi d'un coma ayant succédé à un état de mal convulsif. (Deux cas.).

Chez ces deux malades, plusieurs points sont à signaler:

- Dans les deux cas, il s'est agi de jeunes enfants admis dans le service, moins de six heures après l'ingestion du produit toxique.

- Le tableau réalisé à l'entrée, est gravissime, d'emblée: Associant: un état de mal convulsif avec révulsion des globes oculaires, hypertonie des membres. Un coma s'installe alors, tandis que l'on note, l'apparition d'un collapsus cardiovasculaire, et des troubles du rythme respiratoire.

- Ce tableau dramatique, évoluant en quelques heures vers le décès malgré une réanimation et des soins intensifs. (N° 209 , 38.).

IV - LES SIGNES CARDIO-VASCULAIRES.

- Les enfants ayant ingéré, quelques heures auparavant un produit irritant, en proie à des douleurs abdominales, présentant souvent une toux, voire une dyspnée, présentent assez fréquemment une tachycardie. Cependant, ce signe ne présente pas beaucoup d'intérêt vu le contexte clinique. Ce signe disparaissant d'ailleurs avec les autres anomalies.

- La défaillance cardiaque associant à une tachycardie très importante, un bruit de galop, une hépatomégalie, avec accentuation de la dyspnée et de la cyanose, a été retrouvée dans trois cas.

Cette asystolie aigüe fut rapidement résolutive sous l'effet du traitement, dans un cas.

.../...

Dans les deux autres cas, la défaillance cardiaque entrant dans le cadre d'une véritable faillite polyviscérale, évolua irrémédiablement vers la mort. (209,38.).

V - LES SIGNES DIGESTIFS.

Dans 14 cas (soit 6,6 %.), ont été retrouvées des douleurs abdominales et de la diarrhée chez les sujets ayant ingéré du pétrole lampant.

En dehors des vomissements initiaux, succédant presque immédiatement à l'ingestion, du toxique, ce signe n'a été retrouvé que dans 11 cas, chez six de ces malades, les vomissements étaient associés à une toux très importante, coqueluchoïde.

VI - LES SIGNES CUTANES.

- Ils ont été rarement retrouvés dans la littérature. Cependant, chez trois malades a été notée, une éruption cutanée apparaissant dans les heures qui suivent l'ingestion du produit.

Dans deux cas, il s'est agi d'une éruption phlycténulaire, dans le troisième cas une éruption érythémateuse, en plaques, pseudo-urticarienne. Dans ces trois cas les éléments éruptifs, très prurigineux, ont rapidement évolué vers la guérison.

- A U T O T A L .

L'étude des 210 dossiers, note la prédominance des signes respiratoires, caractérisés par :

- La précocité de leur apparition, qui suggère la possibilité d'une inhalation directe du toxique dans l'arbre bronchique.

Ces signes respiratoires, sont notés d'une manière globale dans 113 cas, soit chez 53,7 % des malades.

- Les deux formes neuro-toxiques observées dans cette série sont remarquables par :

- Leur rapidité d'installation,
- La gravité extrême du tableau réalisé.
- L'évolution en moins de quatre heures vers la mort.

Du point de vue chronologique : deux types de manifestations se dégagent de cette étude clinique :

- I / Les Manifestations Immédiates.

Elles sont représentées par:

a / - L'hyperthermie : Le plus souvent, d'apparition retardée (30 fois/46.), elle peut être retrouvée isolée, résumant à elle seule le tableau clinique. (5 fois.).

b / - Des signes neurologiques tantôt transitoires et sans gravité, ailleurs très graves aboutissant à la mort dans un véritable syndrome malin. (2fois.).

c / - Des troubles respiratoires, de survenue précoce, de type irritatif.; - représentés par la toux, la dyspnée , et, moins souvent la cyanose.

- II / Les Manifestations Retardées.

Ces manifestations retardées sont représentées par l'apparition progressive de signes traduisant l'installation d'une pneumopathie.

Ces manifestations retardées sont en effet dominées par les signes respiratoires qui surviennent, 24 à 48 heures après l'ingestion du toxique, et résumant pratiquement les complications évolutives de cette intoxication .

B / - E V O L U T I O N C L I N I Q U E

Chez 160 des malades de cette série, nous n'avons constaté l'apparition d'aucune complication évolutive . (76,1 %). Ces malades, apyrétiques, sortant au bout de 24 à 48 heures .

Dans 50 cas, (soit chez 23,3 % des malades,) l'évolution a été marquée par l'apparition de complications.

a) - LES COMPLICATIONS PULMONAIRES.

- Leur installation survient en moyenne, 24 heures après l'ingestion du produit toxique.

Elles sont marquées par une ascension thermique vers 38° à 40°, tandis que l'un note une exacerbation des signes fonctionnels respiratoires, en particulier de la dyspnée qui s'accompagne d'un tirage intercostal et sus-sternal intense, avec battement des ailes du nez .

L'auscultation à ce stade , permet alors de découvrir l'existence de foyers de râles crépitants ou sibillants, souvent localisés aux deux bases .

Parfois, la percussion thoracique met en évidence une sub-matité à ce niveau (4 cas) rarement une matité franche .

- Ces complications respiratoires, ont évolué dans 48 cas, vers la guérison en 3 ou 4 jours.

Cette guérison étant marquée par la diminution progressive des signes fonctionnels respiratoires, tandis que la température revient à la normale en 48 ou 72 heures. Dans 7 cas cette évolution a été plus longue, marquée par la persistance pendant plus d'une semaine des signes fonctionnels respiratoires. La guérison cependant était complète au bout de 8 jours.

Dans un cas, enfin, on note l'apparition, au quatrième jour d'un pneumothorax clinique (et Radiologique.) vraisemblablement dû, à la rupture dans la plèvre d'une formation bulleuse.

Dans tous ces cas, l'évolution, sévère, car survenant chez de très jeunes sujets, s'est faite vers la guérison en 8 à 23 jours, sans séquelles.

b) - Les Formes à Composante Neurologique Dominante.

- Ces formes à composante neurologique dominante, sont représentées par les observations (209 et 38).

- Le tableau est stéréotypé dans les deux cas :

- Il s'agit d'enfants de 1 an ayant ingéré une petite quantité de pétrole lampant; (La quantité de produit ingérée par les enfants étant généralement sous-estimée par les parents, il est toujours difficile de s'en faire une idée exacte. .
moins de 6 heures avant leur admission .

A l'entrée, le tableau est dramatique. L'enfant, pâle, présente des crises convulsives itératives, avec révulsion des yeux, hyper-extension de la tête, et des membres, en pronation aux membres supérieurs, et en varus au niveau des pieds.

Une expectoration spumeuse apparaît aux commissures labiales, tandis que, les deux champs pulmonaires sont envahis par une marée de râles, rendant l'auscultation cardiaque très difficile.

Le pouls, petit, filant, difficilement comptable, est très accéléré. (supérieur à 180/mn.).

Une cyanose péri-buccale et des extrémités apparaît, la peau, froide, est recouverte de sueurs. Le tirage intercostal est impressionnant, tandis que l'on note l'apparition de phases d'apnée.

L'enfant sombre alors dans le coma , une heure après son admission; une hépatomégalie importante, d'installation rapide apparaît avec reflux hépato-jugulaire, complétant ce tableau d'asystolie aigüe .

.../...

Une réanimation intensive est immédiatement entreprise, elle s'avère toutefois vaine et la mort survient en moins de quatre heures.

Donc, rapidité extrême d'installation d'un véritable syndrome malin, à dominante neurologique, évoluant rapidement vers la mort .

10 heures se sont écoulées en moyenne, entre l'ingestion du pétrole, et le décès.

c) - LES AUTRES COMPLICATIONS.

Parmi les 210 malades, hospitalisés dans le service de réanimation de l'hôpital d'El-Kettar, nous n'avons pas relevé d'autres complications viscérales vraies.

C / - LES R E S U L T A T S.

- Durant la période allant du premier Janvier 1966 au 31 Décembre 1971 , 210 sujets ayant ingéré du pétrole lampant ont été hospitalisés dans le service de Réanimation de l'hôpital d' El-Kettar .

- Dans 160 cas, l'évolution, tout à fait bénigne, n'a été marquée par la survenue d'aucune complication, **tous** ces malades sont sortis au bout de 24 à 48 heures.

- Dans 48 cas, l'évolution a été marquée par la survenue de complications qui furent sévères chez 7 de ces malades. Dans tous ces cas, cependant, la guérison était obtenue en 1 à 3 semaines , sans séquelles.

- Dans deux cas enfin, les malades sont décédés moins de 4 heures après leur admission. (209 , 38.).

- La durée moyenne globale d'hospitalisation dans cette série de 210 malades, a été de 80 heures environ.

SIGNES CLINIQUES RETROUVES A L'ENTREE.

(Tableau V)

		NOMBRE DE CAS	POURCENTAGE
SIGNES RESPIRATOIRES	(TOUX DYSPEE CYANOSE RALES MATITE	113 cas	53,7 % des malades
HYPERTHERMIE		46 cas	21,9 % des malades
SIGNES DIGESTIFS	(VOMISSEMENTS DOUL. ABDOMINALES DIARRHEE	14 cas	6,6 % des malades
SIGNES NEUROLOGIQUES	CONVULSIONS	3 cas	1,45 % des malades
	OBNUBILATION TORPEUR	43 cas	20,9 % des malades
	COMA SUB-COMA	3 cas	1,45 % des malades
SIGNES CARDIO-VASC.	TACHYCARDIE	16 cas	7,06 % des malades
	DEFAILLANCE CARDIAQUE	1 cas	0,47 % des malades
SIGNES CUTANES	(PHLYCTENES ERYTHEMES	3 cas	1,45 % des malades

ETUDE RADIOLOGIQUE .

- Dans ce chapitre, seront successivement envisagés:

I - Les images rencontrées.

II- Le siège des anomalies radiologiques.

III- L'évolution radiologique .

IV- Les séquelles radiologiques.

- L'étude radiologique de ces malades, a comporté dans tous les cas, un cliché thoracique en incidence de face. Parfois, ont été pratiqués des clichés de profil .

- Sur les 210 malades hospitalisés, 123 présentent des anomalies radiologiques à l'entrée.

- Certains de ces sujets ne présentent par ailleurs aucune anomalie fonctionnelle ou physique respiratoire.

- Ces anomalies radiologiques semblent donc s'installer très précocément après l'ingestion du produit toxique. (Puisque, comme nous l'avons vu, dans la grande majorité des cas, les malades sont vus dans les heures qui suivent l'ingestion.).

- Chez 71 malades, aucune anomalie radiologique n'est notée à l'entrée .

I - LES IMAGES RADIOLOGIQUES RENCONTREES.

Dans la plus grande partie des cas, il s'agit d'opacités non systématisées de type variable :

- Opacités nuageuses ou floconneuses, non homogènes.
- Opacités micro ou macro-nodulaires, ailleurs, images pommelées réalisant un aspect de broncho-pneumonie.
- Dans deux cas, on retrouve une opacité diffuse quasi-homogène, pseudo-liquidienne.
- Dans plus de 50 % des cas, il existe une accentuation importante des opacités hilaires broncho-vasculaires, réalisant un aspect de "hilite", ou de pneumopathie hilifuge.

III - LE SIEGE DES ANOMALIES.

a) - ANOMALIES RADIOLOGIQUES UNILATERALES.

L'analyse des clichés de nos malades, à l'entrée, montre que, lorsque les anomalies sont unilatérales, (54 cas.) elles prédominent à droite dans la grande majorité des cas (39 cas) et plus précisément, à la base droite.

A ce niveau, sont réalisés des aspects divers: Opacités comblant l'angle cardiophrénique, ou opacités lobaires inférieures, ou alors, segmentaires para-cardiaques. Chez 15 de nos malades, les anomalies radiologiques, sont localisées au champ pulmonaire gauche.

b) - ANOMALIES RADIOLOGIQUES BILATERALES.

Chez la plupart de nos malades, (69 cas.) les images sont bilatérales, diffuses dans les deux champs pulmonaires.

III - L'EVOLUTION RADIOLOGIQUE.

- La guérison clinique précède le plus souvent, et parfois de beaucoup, la guérison radiologique.

Dans 41 cas, les anomalies radiologiques se sont estompées progressivement, en quelques jours.

Cependant, dans 7 cas, nous avons assisté à une extension des images, l'évolution trainante, étant alors marquée:

- Dans un cas, par l'apparition d'un pneumothorax vraisemblablement dû à la rupture dans la plèvre, d'une cavité aérienne. Cet épanchement, après exsufflation, a évolué vers la résorption, en 3 semaines.

- Dans un autre cas, au sein d'une opacité assez dense de la base droite, est apparue une image hydro-aérique, traduisant la formation d'un abcès pulmonaire au quatrième jour de l'évolution. Sa résorption, lente, mais complète fût obtenue en 23 jours.

- Une observation sortant du cadre chronologique de cette étude, mérite cependant d'être rapportée.

Il s'agit d'une fillette de 2 ans admise dans le service le 4 Avril 1972 après avoir ingéré, le jour même, une faible quantité de pétrole lampant.

.../...

Le cliché d'entrée, montre l'existence d'une opacité inhomogène de la base droite. Dans les jours suivants, l'opacité s'étend vers le haut .

Sur le cliché du 27/04/1972, soit , 23 jours après l'admission, apparaissent, au sein de l'opacité, des images claires, finement cerclées, polycycliques, localisées à la base droite .

Un pneumothorax apparait par la suite (28/04/1972) nécessitant une exsufflation. Cependant, les images bulleuses persistent sur tous les clichés ultérieurs, même après résorption du pneumothorax.

A près deux mois de traitement, les images bulleuses sont toujours présentes, alors que l'enfant, apyrétieux depuis longtemps, ne présente aucune manifestation fonctionnelle, ou physique respiratoire.

Le 4/06/1972, l'enfant, considérée comme guérie sort, conservant des images bulleuses résiduelles.

IV - LES SEQUELLES RADIOLOGIQUES

A leur sortie, aucun des malades de cette série, ne présentait de séquelles radiologiques. Notons cependant, que les images de type hilifuge ("hilite"), ont été les plus longues à disparaître. Leur persistance, toutefois, ne s'est jamais accompagnée d'aucune manifestation fonctionnelle ou physique respiratoire .

- A titre d'exemple, quelques radiographies. Sont présentées, dans les pages suivantes .

...the

... ..

175

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

SIGNES RADIOLOGIQUES A L'ENTREE

(Tableau VI)

SIGNES Rx	1966	1967	1968	1969	1970	1971	TOTAL	Pourcentage
Présents	15	31	18	20	16	23	123	-
Absents	18	11	6	11	15	6	71	-
Prédominant à droite	7	13	3	7	4	5	39	31,07 %
Prédominant à gauche	0	5	2	2	2	4	15	12,01 %
Bilatéraux	8	13	13	11	10	14	69	56,009 %



K...A., 3/6/67. 2ans Cl. n° 5.

A droite accentuation de la trame broncho-vasculaire
inter-hilo-diaphragmatique.

- A gauche, opacité externe de la base .



G... D., 11/04/1972 . 18 mois Cl. n° 2

Au niveau de la base droite des images claires,
polycycliques

- décollement pleural base droite .



G... D., 16/05/1972. 2ans Cl. n° 3

Même malade que le cliché précédent, extension du pneumothorax droit .



B... M;, 1/11/1967. 18 mois Cl. n° 6.

Opacité basale droite .

ETUDE THERAPEUTIQUE

Dans ce chapitre, seront envisagés successivement :

- Les armes thérapeutiques, et les modalités d'application.

- Les résultats .

A - LES ARMES THERAPEUTIQUES

Modalités d'application.

Les armes thérapeutiques utilisées ont été les suivantes:

- Les Antibiotiques.
- Les Anti-inflammatoires.
- Le Lavage gastrique .

I - LES ANTI BIOTIQUES .

Parmi les 210 malades hospitalisés dans le service pour intoxication par le pétrole lampant, 126, n'ont reçu que des Antibiotiques.

Parmi les antibiotiques, le plus utilisé a été la PENICILLINE G. à la dose de 1 Million d'unités par 24 heures, par voie intramusculaire .

Chez certains malades perfusés, la pénicilline a été administrée par voie veineuse dans le liquide de perfusion .

Dans certains cas, était administrée l'association pénicilline-colistine, ou , pénicilline et tétracycline, ou sulfamides de type Sultirène(Sulfaméthoxypyridazine.).

Chez certains malades, devant une surinfection staphylococcique, ont été utilisées des pénicillines semi-synthétiques, ou autres anti-staphylococciques. (Oxacilline, Méthicilline, Novobiocine).

II - LES ANTI-INFLAMMATOIRES.

Des médications anti-inflammatoires, ont été utilisées chez les malades présentant des complications respiratoires ou neurologiques sévères. 74 des malades de cette série, ont reçu une association d'antibiotiques et de médicaments anti-inflammatoires.

Chez la plupart des malades, nous avons utilisé :

- LES CORTICOIDES .

Les corticoides ont été administrés, suivant les cas, par voie orale, ou par voie parentérale.

Le corticoïde utilisé par voie orale a été, dans tous les cas : La Prednisone. Elle fut administrée à des doses variant avec le poids et l'âge du sujet, et, d'une manière générale pendant une assez courte période .

Lorsque l'état du malade l'a exigé, les corticoides ont été administrés par voie veineuse, directement dans la tubulure du flacon de perfusion.

Il s'agit dans ces cas, de l'Hémi-Succinate- d'Hydrocortisone. Les doses administrées, très variables, allant de 25 à 100, voire 200 mgr/24 heures. Dans certains cas très bénins, l'anti-inflammatoire utilisé a été l'Oxyphenbutazone (Tandéril.) à la dose de 10 mgr/kg. administré par voie rectale.

III - LE LAVAGE GASTRIQUE.

- Le lavage gastrique a été très peu utilisé dans le service. Dans tous les cas, il s'agit de sujets ne présentant aucun trouble de la conscience, et dont l'ingestion de pétrole remonte à très peu de temps.

.../...

Dans ces cas, le lavage gastrique (8 cas.) a été effectué avec de l'eau albumineuse, et n'a donné lieu à aucune complication.

IV - LA TRACHEOTOMIE AVEC VENTILATION SOUS PRESSION POSITIVE.

- La trachéotomie, et la ventilation artificielle sous pression positive, ont dû être utilisées dans trois cas graves comportant une détresse respiratoire aigüe .

Dans deux des cas, l'évolution a été mortelle en quelques heures .

B / - LES R E S U L T A T S


- 210 malades ayant ingéré du pétrole lampant, durant la période allant du 1er Janvier 1966 au 31 Décembre 1971, ont été hospitalisés dans le service de Réanimation de l'Hôpital d'El-Kettar.

Dans cette série, 208 guérisons, et 2 décès (0,95 %) ont été enregistrés. Le traitement associant, antibiotiques et corticoides, a été satisfaisant, d'une manière générale, aboutissant à la guérison de ces 208 malades en un temps de 3 à 23 jours.

Les deux décès de cette série, intéressent deux jeunes enfants ayant ingéré, moins de 6 heures avant leur admission , du pétrole lampant .

Le tableau d'entrée, gravissime, associait : un collapsus cardio-vasculaire, une détresse respiratoire aigüe, et des troubles neurologiques majeurs.

Le décès survenant, dans les deux cas, moins de 4 heures après l'admission de ces petits malades.



TABEAU DES TRAITEMENTS REÇUS

(Tableau VII)

TRAITEMENTS	1966	1967	1968	1969	1970	1971	
ATB. Seuls	34	29	17	18	21	7	126
ATB. + ANTI-INFL.	4	14	9	13	10	24	74
MEDDICAMENTS + LAVAGE- GASTRIQUE	3	2	0	2	1	0	8
							200

II OS () B S F R V A T I O N S

*=**

N.P.	N°	Age	Sexe	NAT. INT.	Quitté	Moment	Date d'entrée	Etat clinique d'entrée	Radiopulmon. d'entrée	Traitement	Evolution clinique	Evolution Radiolog.	Issue
B. A.	18	18 mois	F	Invol	Vapeurs	le j. même	3.1.66	Légère Torpeur RAS par ailleurs	—	Péni. O ₂	bonne	—	Sortie + 0 j.
F. R.	231	18 mois	M	I	—	le j. même	26.2.66	CONST. Refl + Acc. RAS Encombr. br.	Accentuation opacités hilaires	Tifo.	bonne	bonne	Sortie + 5 j.
B. M.	2416	2 ans	M	I	—	le j. même	20.7.66	Torpeur - Dyspnée -	opacités jumellees base Droite	Péni.	bonne	bonne	Sortie + 2 j.
G. O.	2349	18 mois	F	I	/	le j. même	19.7.66	CONST. Acc. RAS Dyspnée	Infiltration bilatérale péri-hilaire ++	Péni. Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie + 8 j.
N. H.	767	2 ans	M	I.	/	le j. même	22.7.66	Examen Normal Encombr. br.	cliché Normal.	Péni.	bonne	—	Sortie + 2 j.
B. M.	109	18 mois	F	I	20 cc.	le j. même	29.5.66	Examen Normal	opacités hilaires bilat. discrètes	Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie + 2 j.
H. A.	485	6 ans	M	I	/	le j. même	29.7.66	Examen Normal.	cliché Normal	Tifo. Sult.	bonne	bonne	Sortie + 5 j.
F. M.	1048	30 ans	F	VI.	/	le j. même	21.8.66	obnubilation discrète - reste Normal.	cliché Normal	Péni. - Coli O ₂	bonne	bonne	Sortie + 1 j.
F. B.	249	4 ans	M	I	/	le j. même	27.7.66	Somnolence. Obnubilation Reste Normal	cliché Normal	Péni. Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie + 3 j.
B. K.	888	18 mois	M	I	10 cc.	le j. même	4.8.66	Toux irritative Examen Normal apyrexie	opacité discrète base D ₆	Tifo. Sult. cortancyl	initialement bonne, puis rechasp. pour hyperth.	bonne persistance accent. trame	Sortie + 27 j.

N.P	N°	Age	Sexe	Nat Int	Qualité	Moment	Date Entrée	État clinique à l'entrée	Raidio. Pulm. Entrée.	Traitement	Évolution clinique	Évolution Radiologique	Issue
B... A	1010	3ans	M	Inv	15cc	1e j m	6.X.66	Hyperthermie reste examen Normal	opacités hilaires bilatérales, peu caractéristiques	Péni	bonne	bonne	Sortie + 1 J
T... K.	993	2ans	M	I	/	/	3.X.66	Const + Rét + Temp 38.8 Râles diffus + à gauche.	/	Tifo. Sult.	bonne	/	Sortie + 3 J
Z... S.	915	2ans 1/2	M	I	15cc	1e j m.	28.9.66	Dyspnée discrète reste examen Normal	cliche Normal	Tifo. Sult.	bonne	bonne	Sortie + 1 J
A... Y.	745	18mois	M	I	/	1e j. m	15.7.66	légère obnubil. reste Normal.	cliche Normal	Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie + 1 J
D... A.	126	14mois	M	I	1 verre	1e j m	3.2.66	Paste de S. neural. TOUX ++ Râles diffus	opacités basales droite micro nodulaires peu denses peu étendues	Péni. HEXACYCL	hyperth. le jour même puis bonne évolution	bonne	Sortie + 2 J.
L... A	1264	2ans 1/2	M	I	/	1e jour m	11.XII.66	légère obnubil reste examen Normal.	cliche Normal	Péni	bonne	/	Sortie + 2 J
S... M.	881	25ans	F	Vol	1es	1e j. m	25.8.66	Examen Normal.	Cliche Normal	Péni-Coli	bonne	bonne	Sortie + 2 J.
D... A.	914	2ans	M	I	/	1e j. m	6.9.66	Examen Normal mise en observ.	cliche Normal	Péni	bonne	bonne	Sortie + 1 J
B... K.	398	3ans	M	I	/	/	15.4.66	Examen Normal	cliche Normal	Péni-Coli	bonne	bonne	Sortie + 3 J.
F... T	922	2ans 1/2	M	I	/	1e j. même	9.9.66	Somnolence dyspnée	opacités milifuges bilatérales discrettes	Péni	bonne	bonne	Sortie + 2 J

N°	Age	Sexe	Nat. Int	Quitté	Moment	Date entrée	Etat clinique Entrée	Radio, pulmon. Entrée	Traitement	Evolution clinique	Evolution Radiologique	Issue
21	325	19 mois	M	I	1/2 verre	/	Tachycardie. Hyperthermie battammentalable	Infiltr. leu dense. base Droite	Péni-Coli.	bonne	bonne	Sortie + 1J
22	77	16 mois	M	I	1/2 verre	16Jm	Examen. Normal	cliché Normal	Péni Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie + 1J
23	934	2 ans	F.	I	/	16Jm	Somnolence hyperthyroïdisme	pneumopathie double discrète	Péni-Solnic. H.H.C	bonne	bonne	Sortie + 7J
24	1084	20 ans	F	/	/	30.x.66	Examen Normal	cliché Normal	Péni lavage gastrique	bonne	bonne	Sortie + 1J
25	1050	2 ans	M	I	16Jm	21.x.66	Encombr. bronchique RAS parailleurs	cliché Normal	Péni lavage gastrique	bonne	bonne	Sortie + 1J
26	516	2 ans	F	I	20cc.	18.5.66	Hyperthermie Encombr. bronch.	Surcharge bilat	Péni Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie + 1J
27	873	1 an	M	I	10cc	16Jm	Examen Normal Temp. 38°	petite opacité l'arcadiaque basale droite	Péni-Coli hospital.	bonne	bonne	Sortie + 2J
28	396	15 mois	F	I	/	18.11.66	Toux irritative Examen Normal	cliché Normal	Péni	observ 24H	/	Sortie + 1J
29	854	9 mois	M	I	/	20.8.66	Examen. Normal	Cliché. Normal	Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie C.A.M. + 0J
30	1005	3 ans	M	I	/	6.x.66	Examen Normal.	cliché Normal	Tifo.	bonne	/	Sortie + 2J

N.P.	N°	Age	Sexe	Nat. Int.	Quité	Moment	Date Entrée	Etat clinique ENTRÉE	Radio, pulmon. ENTRÉE	TRAITEMENT	Evolution clinique	Evolution Radiologique	Issue
31 B... M.	2185	4ans	M	I	/	1e j.m	3.7.66	Dyspnée discrète RAS parailleurs	Dicrète accent. Trame vascul.	Péni Terra.	observ. 24 H.-RAS.	/	Sortie + 1 J
32 G... O	1849	2ans	F	I	/	18.8.66	19.8.66	Toux. Rales. bilat	cliché Normal	Péni	/	/	Sortie + 1 J
33 K... M	574	1an	M	I	/	1e j.m	25.8.66	obnubil hyperthermie dyspnée	opacité peu dense non systématisée de la base Droite	Péni-Coli	bonne	bonne	Sortie + 1 J
34 S... M.	297	2ans	M	I	/	/	20.2.66	Examen Normal.	cliché Normal.	Péni-lavage gastrique.	bonne. observ. 24 H.-RAS.	/	Sortie + 1 J
35 Q... M.	1321	2ans	M	I	10cc	4. j.m	23.XII.66	Hyperthermie ++ Vomissements RAS parailleurs	opacités multiples discrètes	Tifo	bonne	bonne	Sortie + 1 J
36 K... B.	259	13 mois	M	I	/	/	6.3.66.	RAS à l'examen	cliché Normal	Péni O ₂	bonne	/	Sortie + 1 J
37 A... F.	642	14 mois	F	I	1/2 verre	1e j.m	24.6.66	Torpeur, hyperthermie cyanose.	opacité base Droite	Péni Solnicol	bonne ent 15 J.	niveau liquide au sein de l'opacité. regression lente.	Sortie + 5 J
38 B... F.	38	1an	F	I	/	4 heures avant	17.8.66	Coma profond. alpes convulsions hypertonie des membres collabos C.V. rales ++	pas de cliché	réanimation Trachéotomie Ventilation	rapidement fatale		DÉCÈS 2 H après admission

	NP	N°	Age	Sexe	Mat Int	Quitté	Moment Date entrée	État clinique à l'ENTRÉE	Clichés pulm. Entrée	TRAIEMENT	Evolution Clinique	Evolution Radiolog.	Issue
50	B... R...	702	18 mois	M	I		12.j. M	obnubil faciès vultueux reste Normal	opacités floconneuses peu étendues base droite	Péni. Coli.	bonne	✓	Sortie + 2J
51	K... A.	590	3 ans	F	I		6.8.67	Vermissements douleurs abdom.	petites opacités cardio. prérenique droite	Tifo. Sult Cortancyl	bonne	bonne	Sortie + 5J
52	C... N.	1264	2 ans	F	I	1 verre	12.12.67	Tachycardie Toux, râles diffus	opacités nuageuses diffuses bilat	Tifo Sult.	bonne	bonne	Sortie + 4J
53	B... F	1263	18 mois	M	I	1/2 verre	11.11.67	dyspnée + tachycardie	opacités nuageuses diffuses, bilat prédom à droite	Tifo Sult	bonne	bonne	Sortie + 4J
54	N... N.	1270	3 ans	M	I	10 cc.	13.11.67	Toux - hyperth. reste Normal	Accentuation trame vasculaire	Péni Tifo	bonne	bonne	Sortie + 2J
55	B... F.	844	3 ans	M	I		20.8.67	hyperthermie sans plus.	Images reticulées predominant à la base droite	Tifo. Sult. Cortancyl	bonne	bonne	Sortie + 4J
56	H... F.	847	18 mois	F	I	12 j M	24.8.67	Examen Normal	accentuation trame broncho. vasculaire.	Tifo	bonne	bonne	Sortie + 5J
57	B... F.	280	16 mois	F	I	12 j M	23.3.67	crise convulsive après ingestion reste Normal	Cliche' Normal	éav. calbun	bonne	bonne	Sortie + 2J
58	N... F.	5	16 mois	F	I		2.1.67	Examen Normal	Cliche' Normal	Péni + 114 C. Hospital	bonne	RAS	Sortie + 2J
59	H.M	957	1 an	M	I	1/2 verre	12.j.m	Toux. Vomissements examen Nl.	Tliche' Normal	Tifo Sult	bonne	bonne	Sortie + 2J
60	M... M.	759	3 ans	M	I		3.8.67	Toux dyspnée râles fins aux 2 bases	opacités basales bilat non systémat	Tifo Sult Cortancyl	bonne	bonne	Sortie + 2J

N°	Age	Sexe	Nat	Quitté	Moment	Date entrée	État clinique à l'entrée	Radiol. pulmon. d'entrée	TRAIEMENT	Evol. clinique	Evolution Radiologique	Issue.
61 G... D	737 2ans	F	I	1/2 verre	27-7-67	29-7-67	hyperthermie. Toux abattement	cliché Normal	Tifo. Sulf. Cortancyl	bonne	bonne	Sortie + 5 J
62 Z... S	918 3ans	F	I		1e j. m	8-9-67	Toux. hyperth. Examen NL.	cliché Normal	Tifo. Sulf. Cortancyl	bonne	bonne	Sortie + 6 J.
63 F... A.	667 30 mois	M	I		15-7-67	16-7-67	Dyspnée hyperthermie	opacités hil. fuges discretes	Tifo. Sulf. Cortancyl	bonne	bonne	Sortie + 3 J
64 R... M.	828 2ans	M	I		16-8-67	18-8-67	Toux - dyspn. rales. bronch.	opacité nuageuse base gauche	Tifo. Cortancyl	bonne	nettoyage en 3 jours	sortie + 6 J
65 I... A.	1059 18 mois	M	I		1e j. m	14-2-67	EXAMEN Normal	opacités para hilaires	Tifo Cortancyl	bonne	bonne	Sortie + 3 J
66 Z... S.	262 1an 1/2	M	I		1e j. m	18-3-67	Examen Normal	cliché Normal	Péni	bonne	bonne	Sortie + 2 J.
67 K... S.	1837 17 mois	M	I		1e j. m	22-2-67	obnubil- Dyspnée encombr. br.	accentuation opacités - br. vasc.	Péni O ₂ eau. Alb.	bonne	bonne	Sortie c.A.M + 2 J
68 K... F.	928 18 mois	F	I		1e verre	19-67	Dyspnée discrete RAS par ailleurs	Infiltrat micro-nodul base droite	Tifo. Sulf	bonne	bonne	Sortie c.A.M + 2 J
69 B... M.	64 2ans	M	I		1e j. m	21-1-67	Examen Normal	cliché Normal	Péni-Coli	bonne	bonne	Sortie c.A.M + 7 J
70 A... F	1248 2ans	F	I		3.XII.67	5.XII.67	EXAMEN NORMAL	cliché Normal	Tifo Sulf	bonne	bonne	Sortie + 2 J

NP	N°	Age	Sexe	Nat Lit	Quitté	Moment	Date Entrée	Etat clinique Entrée	cl. chéj pulmon Entrée	Traitement	Evolution clinique	Evolution Radiol.	Issue
1 B. T.	119	10 mois	M	I		30.X.67	31.X.67	Toux. dyspn. rales diffus	opacité assez dense nuageuse base droite	Tifo. Sulf.	bonne	bonne	Sortie + 3j.
2 M. K.	291	3 ans	M	I		28.3.67	28.3.67 29.3.67	hyperth. Toux dyspnée	Discrète infiltr base droite	Tifo Sulf.	bonne	bonne	Sortie + 3j.
3 B. T.	1022	4 ans	M	I		2.X.67	5.X.67	hyperth. pneumopathie gauche.	opacité gauche basale peu dense	Tifo	bonne	bonne	Sortie + 4j.
4 H. K.	1243	17 mois	M	I		1e j. M	3.X.11.67	Examen Normal.	opacités hilifuges bilat.	Péni Tifo	bonne	bonne	Sortie + 4j.
5 B. F.	1684	18 mois	M	I		1e j. M	27.X.67	Examen Normal.	Images réticulées hilifuges	Eau Alb.	bonne	bonne	Sortie Eau + 2j.
6 S. F.	1003	4 ans	F	I		1e j. M	27.X.67	rales fins base droite	cliché peu altéré	Péni Hexacycl	bonne	bonne	Sortie + 3j.
7 B. Z.	841	1 an	M	I			20.8.67	Sensiblement Normal	-	Lavage gastrolique	bonne		Sortie 1e j. M.
8 B. S.	867	2 ans	F	I		1e j. M	21.8.67	PALEUR. sufurs. reste Normal	infiltration bilatérale para-mediast.	Bristopen	bonne	bonne	Sortie + 4j.
9 B. Z.	1176	5 ans	F	I		1e j. M	15.11.67	Dyspnée Encombr. bronch.	cliché Normal.	Tifo. Sulf.	bonne	bonne	Sortie + 3j.
10 S. H.	561	4 ans	F	I		1e j. M	21.6.67	Dyspnée hyperthermie	cliché Normal.	Péni eau Alb.	bonne	bonne	Sortie + 2j.

N.P	N°	Age	Sexe	Mat Int	Quitté	Moment	Date Entrée	Etat clinique entrée	cliché pulmon. entrée	Traitement	Evolution clinique	Evolution Radiol	Issue
81	S... K.	474	1an	M	I	14.5.67	25.V.67	Symptômes rales bronch bilat.		Péni	bonne	bonne	Sortie + 25
82	D... H.	685	18m.	M	I		19.7.67	Examen NL.	cliché NL.	Péni	bonne	bonne	Sortie + 25
83	D... H.	709	2ans	M	I	14.5.67	23.6.67	hyperthermie isolée	opacités hvaqueuse peu dense. base droite	Péni. Sult. Cortancyl	bonne	bonne	Sortie + 45
84	B... H.	477	2ans	F	I	14.5.67	15.5.67	Examen Normal	cliché Normal.	Péni	bonne	bonne	Sortie + 15
85	K... A.	486	3ans	M	I	26.5.67	27.5.67	Tachycardie. hyperthermie polyphie - facès Vultueux	opacités floconneuses des 2. bases + à Droite	Péni Tifo H.H.C.	bonne appexie en 55.	accentuat. opacités visu nettop en 85.	Sortie + 45
86	B... Z.	63	2ans	F	I		21.1.67	hyperthermie isolée	cliché Normal.	Tifo Sult Cort.	Persist. fièvre 35	bonne	Sortie cort. + 55
87	B... F.	280	16mois	F	I	14.5.67	23.3.67	Convulsions initiales - Examen Normal	RAS.	eau. alb.	bonne	RAS	Sortie + 2 j.

Année 1968

- 10 -

I

N°	Age	Sexe	Nat	Int	Quité	Date	Moment	Etat clinique	Radio pulm	TRAITEMENT	Evolution clinique	Evolution Radiol.	Issue
88 M... S	838	18 mois	M	I	-	21.VII.68		const. Refl + ACV. RAS Dyspnée	cliché NL.	Tifo. Sulf.	bonne en 2 J	-	Sortie + 3 J.
89 B... Fz.	673	2 Ans	F	I	10cc	16.6.68	11.5.68	Dyspnée reste Normal	RAS	Péni	bonne	bonne	Sortie + 2 J
90 S... A.	665	15 mois	M	I	-	14.6.68	11.5.68	Toux. dyspnée rales bilat.	infiltration diffuse bilat à prédominance Droite	Péni Sulf.	bonne	bonne	Sortie + 3 J
91 D... M	32	3 ans	M	I	-	7.1.68		rales ronflants bilatéraux	opacités floconneuses prédominant à droite	Péni	bonne	bonne	Sortie + 5 J
92 B... K.	179	6 ans	M	I	-	15.2.68	11.5.68	abnubil. dyspnée. cyanose, rales diffus	surcharge hilaire bilat.	Tifo Sulf.	bonne	bonne	Sortie + 2 J
93 G... A.	146	3 ans	M	I	-	7.2.68		Dyspnée discrète	surcharge hilaire	Tifo	bonne	bonne	Sortie + 4 J
94 I... T.	1159	2 ans	F	I	1/2 verre	18.XI.68	-	Examen Normal Toux discrète	RAS	Péni	bonne	-	Sortie + 2 J
95 K... R.	1071	18 mois	M	I	-	11.XI.68	10.XI.68	Agitation Toux. Vomissements	Cardiomégalie poumons RAS	Tifo	bonne	bonne	Sortie + 1 J
96 T... T.	784	2 ans	M	I	-	10.7.68		obnubilation agitation taux. dyspnée tachycardie rales. hyperth.	opacités bilat. discretes.	Solnicol flabelline H.M.C	bonne	bonne	Sortie + 7 J
97 S... M.	780	18 mois	M	I	-	9.7.68		somnolence. RAS. parailleurs		Péni Tifo	bonne	-	Sortie + 1 J

NP	N°	Age	Sexe	Mat Int	Quête	Moment	Date Entrée	Etat clinique Entrée	Radio pulm. Entrée	TRAITEMENT	Evolution Clinique	Evolution Radiol	Issue
98	S... D	1122	14 mois	M	I	10 X 68	11.1.68	Examen Normal		Péni Tifo	bonne	—	Sortie + 1 J
99	S... H	828	2 ans	M	I	30 cc.	15.7.68	obnubil. Rot+ Toux dyspnée discrète	opacités hilifuges discrètes	Tifo H.H.C	bonne	bonne	Sortie + 1 J
100	I... H.	1030	3 ans 1/2	F	I	1/2 verre	13.9.68	obnubil. Toux dyspnée discrète.	opacités hilifuges discrètes	Tifo	RAS	bonne	Sortie + 3 J
102	B... K.	534	3 ans	F	I		11.5.68	Examen Normal	RAS	0	bonne	bonne	Sortie + 1 J
103	A... H	591	15 mois	F	I		1e j. m	obnubil. dyspnée, râles ++ à Droite	opacités floconneuses ++ à droite	Péni H.H.C	bonne	bonne	Sortie + 2 J
104	P... F.	566	3 ans	M	I	1/2 verre	1e j. m	Agitation, Toux, Vts. dyspnée	Radio. Normale	Péni H.H.C	bonne	bonne	Sortie + 2 J
105	H... R.	1052	18 mois	M	I		20.11.68	EXAMEN NORMAL	opacités para-hilaires discrètes	Péni Phosphal	bonne	bonne	Sortie + 1 J
106	1071 D.	1071	18 mois	F	I	20 cc.	1e j. m	Dyspnée hyperthermie	opacités broncho-vasculaires accentuées	Tifo	bonne	bonne	Sortie + 1 J
107	D.	901	20 mois	F	I	1/2 verre	1e j. m	Examen Normal	opacités inhomogènes base droite	Péni Sult	bonne	bonne	Sortie + 3 J
108	H... R.	891	3 ans	M	I	1 verre	1e j. m	Râles discrets Sans l'us		Péni Sult.	bonne	bonne	Sortie + 1 J

Année 1968

- 74 -

III

N°	N°	AGE	SEXE	NAT INT	Quité	Moment	Date entrée	Etat clinique à l'entrée	cliché pulmon. entrée	Traitement	Evolution clinique	Evol. Radiol	Issue
109	366 BS	5 ans 1/2 → 366 5 ans 1/2	F	I	1 verre	11.5.68	30.3.68	Dyspnée discrete	surcharge hilaire gauche H.	Ti fo Sult. Tanderil	bonne	bonne	Sortie + 2 J
110	B... S.	17 mois	F	I			15.7.68	Toux, fièvre dyspnée sub. matité base gauche.	opacité base gauche. homogène.	Solnicol Tanderil	hyperth. pendant 2 J.	nettoyage en 3 J	Sortie + 8 J
111	L... S	17 mois	F	I	20cc	17.7.68	19.7.68	Dyspnée sans plus	opacités hilifuges bilat. discretes.	Péni Ti FO. H. H. C.	bonne	bonne	Sortie + 2 J
112	L... L.	15 mois	M	I			16.7.68	Toux Examen N.L.	RAS.	Péni Solnicol HAC.	bonne	bonne	Sortie + 2 J
113	C... A.	18 mois	M	I	1 verre	2.3.68	3.3.68	Tachycardie polylnée reste Normal.	Accentuation des opacités broncho- vasculaires	Péni	bonne	bonne	Sortie + 3 J
114	B... D.	2 ans	M	I		17.7.68	18.8.68	Examen Normal	cliché Normal.	Péni Phosphal	bonne	bonne	Sortie CAT + 2 J
115	K... M	3 ans	M	I			4.7.68	obnubilation polylnée		Péni H. H. C.	bonne	bonne	sortie + 2 J

8th Sept

Time	Location	Notes	Temp	Wind	Cloud	Pressure	Humidity	Visibility	Remarks
06:00	London	Clear	15°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
07:00	London	Clear	16°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
08:00	London	Clear	17°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
09:00	London	Clear	18°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
10:00	London	Clear	19°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
11:00	London	Clear	20°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
12:00	London	Clear	21°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
13:00	London	Clear	22°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
14:00	London	Clear	23°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
15:00	London	Clear	24°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
16:00	London	Clear	25°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
17:00	London	Clear	26°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
18:00	London	Clear	27°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
19:00	London	Clear	28°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
20:00	London	Clear	29°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
21:00	London	Clear	30°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
22:00	London	Clear	31°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
23:00	London	Clear	32°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day
24:00	London	Clear	33°C	Light	0%	1013	65%	10km	Start of day

N°	AGE	SEXE	NAT	Quitté	Moment	DATE	ÉTAT clinique à l'entrée	cliche pulm. entrée	Traitement	Évol. clinique	Évol. Radiol	Issue
116 B... H	1272 18 mois	M	I			4/11/69	Examen Normal	Cliche Normal	lavage gastrique	bonne	bonne	Sortie + 15
117 G... A	922 1 an	M	I			26/8/69	opubilation discrète, dyspnee	images floconn. bilatérales ++ à Droite	Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie + 25
118 H... H.	892 18 mois	F	I		10/8/69	18/8/69	hyperthermie dyspnee Toux. râles bronch. bilat.	opacités para-hilaire gauche	Bristolen Solmical H.H.C.	bonne	bonne	Sortie + 25
119 B... H.	857 2 ans	M	I	1 verre	10/8/69	11/8/69	Dyspnee DouL abdom.	cliche NR.	Tifomycine	bonne	bonne	Sortie + 25
120 A... A.	968 18 mois	M	I		4/9/69	5/9/69	Toux. Dyspn. râles bronch. éruption. prurigineuse	cliche Normal	Péni. Terra	bonne	bonne	Sortie + 45
121 T... B.	889 2 ans	F	I			17/8/69	EXAMEN NORMAL.	opacités floconneuses non systém. à Droite ++	Aristolen Solmical H.H.C.	bonne	bonne	Sortie + 45
122 B... Z.	865 18 mois	F	I		11/8/69	12/8/69	EXAMEN NORMAL.	cliche Normal.	Péni H.H.C.	bonne	bonne	Sortie + 35
123 B... R.	957 2 mois	M	I	1/2 verre	12/8/69	5/9/69	EXAMEN NORMAL.	—	Terra.	bonne	bonne	Sortie + 25
124 B... S.	908 2 ans	M	I		21/8/69	22/8/69	EXAMEN NORMAL.	opacités hilifuges discrètes	T. fomycine	bonne	bonne	Sortie + 25
125 A... H.	966 18 mois	F	I		16/8/69	29/8/69	opubiti tachycardie faiblesse polypnée râles fins aux bases	opacités hilaireuses base droite	Aristolen cathosmyc. Cortanqyl	bonne	bonne	Sortie + 45

	N°	AGE	SEXE	NAT	Quité	Moment	DATE ENTRÉE	ÉTAT CLINIQUE ENTRÉE	CLICHÉ PULMON ENTRÉE	TRAITEMENT	EVOL CLINIQUE	EVOL RADIOL.	ISSUE
126	Z... A	2ans 1/2	M	I		27.7.69	28.7.69	Umisements hyperthermie	opacités hilifuges bilat discreètes	Tifo	apprise en 2 J.		Sortie + 2 J
127	Z... H	18 mois	M	I	1/2 verre	16 J.m	29.7.69	Examen NORMAL	cliché Normal	Lavage gastrique	bonne	bonne	Sortie + 1 J
128	G... R.	18 mois	M	I			24.7.69	râles bronchiques diffus. sans plus	RAS. 2	BRISTOPEN CATHOMYLINE H.H.C.	bonne après 1 semaine	?	Sortie CAH + 8 J
129	N... D.	2ans	F	I		16 J.m	16.8.69	obnubilation sub. coma Toux + dyspn. encombr.	broncho pneumopathie aiguë bilat.	BRISTOPEN Solumécrol THAF.	Trachéotomie le 18.8.69. bonne évol. ensuite	bonne	Sortie + 22 J
130	T... H.	4ans	F	I			21.7.69	obnubil. râles s/cr. base gauche	opacité nuageuse base gauche	BRISTOPEN cathom.	bonne	bonne	Sortie + 22 J
131	B... S.	18 mois	M	I		7.9.69	8.9.69	Toux sèche râles bronch bilatéraux	opacités de petite taille bilatérale	Tifo	bonne	bonne	Sortie + 1 J
132	B... N	3ans	F	I	1 verre		5.2.69	Examen Normal. doulab.	cliché. Normal	Péni-coli Tandéfil Phosphal.	bonne	bonne	Sortie + 3 J
133	K... S.	2ans	M	I		16 J.m	15.2.69	Examen Normal.	cliché Normal	Péni Tifo	bonne	bonne	Sortie + 2 J
134	B... R.	18 mois	M	I			6.7.69	Examen NORMAL.	surcharge hilaire bilatérale	Peni Cortancyl phosphal.	bonne	bonne	Sortie + 2 J
135	T... S.	2ans	F	I			30.6.69.	Examen Normal. TOUX	cliché Normal	Péni Cortancyl	bonne	—	Sortie + 2 J

N°	NP	N°	AGE	SEX	Nat	Quatre	Moment	Date	Etat clinique	Radio. pulm	Traitement	Evol. clinique	Evol. RADIOLOG	Issue
136	A... T	2419	11mois	F	I			30.6.69	Toux. RAS para trachéaux	cliché Normal	Péni cortacetyl	bonne	bonne	Sortie + 2 J
137	D... C.	1833	18mois	M	I	1/2 verre		16.5.69	rales bronch. bilateral	opacités hilifuges bilat.	Péni H.H.C Phosphal	bonne	bonne	Sortie + 2 J
138	H... M.	2678	18mois	F	I	1/2 verre		15.7.69	ebouill. tachycard. hyperthermie	Pneumopathie hilifuge bilaterale	Péni Phosphal	bonne apexie gauche	bonne	Sortie + 1 J
139	A... K.	4002	1an	M	I		16j m	22.8.69	Examen Normal	cliché normal.	Péni phosphal	bonne	bonne	Sortie + 2 J
140	A... S.	3630	2ans	M	I			25.9.69	Examen Normal	infiltration para hilaire bilat. discrète	Tifo solt	bonne	bonne	Sortie + 2 J
141	B... M.	1160	18ans	F	Vol		25.3.69	27.3.69	Examen Normal. pharyngites	RAS	Terra phosphal	bonne	bonne	Sortie + 10 J
142	B... A.	1134	4ans	M	I			25.3.69	quelques rales bulleux à droite	Pneumopathie droite discrète	Hexacycl.	bonne	bonne	Sortie + 1 J
143	A... S.	1421	16mois	F	I			15.4.69	EXAMEN NORMAL	CLICHÉ NORMAL	Tifo solt.	bonne	-	Sortie + 1 J
144	B... M.	1035	3ans	M	I		15.3.69	18.3.69	hyperth. Toux. Pneumopathie droite	images floconneuses base droite	Péni Tifo H.H.C	bonne	bonne	Sortie + 2 J
145	B... H.	1015	18mois	M	I		16j m	17.3.69.	Dyspnée discrète. craquelles bronch.	surcharge hilaire à prédom. droite	Péni Tifo	bonne	-	Sortie + 2 J

Année 1969

-78-

IV

NP	N°	AGE	Sexe	Nat- DNT	Quête	Moment	Date entrée	État clinique Entrée	cliniqué pulm. entrée	TRAITEMENT	Evol. clinique	Evol. Radio	Issue
146 B... D.	956	16 ans	F	I	1/2 verre	1e j m	12.3.69	Dyspnée discrete	pneumopathie droite discrete	Tifo H. H.C.	signes clin. de pneumop. Dte. le lendemain	bonne	Sortie + 5 J
147 L... A.	981	1 an	F	I	1/2 verre	1e j m	14.3.69	Râles bronch. reste examen Normal	images floues bilat. peu entendues	Tifo	persist. des signes 48 heures	bonne	Sortie + 4 J
148 K... A.	831	2 ans	M	I		2.3.69	3.3.69	Examen Normal. phlyctènes	cliché NORMAL	Tifo	bonne	bonne	Sortie + 2 J

N°	NP	AGE	SEXE	NAT	Quête	Horiz	Date	Etat clinique	cl. ch. pulm.	TRAITEMENT	Evol. clinique	Evol. Radiol	Issue
149	K... D	3ans	M	I	1 verre		5.9.70	Examen Normal	cl. ch. Normal	Péni	bonne	bonne	Sortie +3J
150	B... H.	3ans 1/2	F	I	1 verre		18.7.70	agitation - reste Normal	cl. ch. Normal	Péni, Tanderil	bonne	bonne	Sortie +3J
151	K... F.	2ans	F	I	1/2 verre		14.8.70	Dyspnée discrète	accentuation trame broncho-pulc	Péni-Col.	bonne	—	Sortie +2J
152	M... M.	17ans	F	Vol			13.8.70	Examen Normal	cl. ch. Normal	Péni	bonne	bonne	Sortie +1J
153	B... S.	7ans	F	I			28.7.70	Polypnée skrep. base gauche	opacité. h. vaguue, pro cardiaque. Gche	Tifo.	bonne	bonne	Sortie +3J
154	R... B.	3ans	M	I		24.7.70	25.7.70	obnubilation	Discrete infiltration bilat.	Péni Tanderil	bonne	bonne	Sortie +3J
155	D... F.	18ans 5	F	I		9.8.70	10.8.70	EXAMEN NORMAL	cl. ch. NORMAL	Péni	bonne	bonne	Sortie +2J
156	B... R.	2ans	M	I	1/2 verre	3.7.70	4.7.70	hyperthermie Dyspnée râles base gauche	opacités h. vaguues des 2 bases	Terra. H.H.C	bonne	bonne	Sortie +3J
157	R... N.	3ans	F	I	1/2 verre		25.6.70	Examen Normal.	Infiltrat base Droite	Sult.	bonne	bonne	Sortie +2J
158	A... L.	18ans	M	I	1 verre		26.6.70	Examen Normal.	cl. ch. Normal.	Péni	bonne	bonne	Sortie +3J

Handwritten notes and a small diagram or sketch.

...

...

22

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

24

1

174
175
176
177
178

3

40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ

1990

100

22

| N° | AGE | SEXE | Mat
INT | Quitté | Nom | Date
entrée | Etat clinique
Entrée | cliché. pulmon
entrée | TRAITEMENT | EVOL.
CLINIQUE | EVOL.
Radiol | ISSUE |
|-----------|------|---------------|------------|--------|-----|----------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 159
K. | 688 | 18 ans | M | I | | | obnubil
Tachycardie
dyspnée | accent
Trame
broncho-
vasc. | Péni | bonne | bonne | Sortie
+ 3 J |
| 160
R. | 1317 | 3 ans | M | I | | 4.11.70 | Toux -
râles bronch
bilat. | cliché
Normal | catom.
Flabelline
H.H.C. | Dyspnée
tr. pendant
99 J. | bonne | Sortie
+ 4 J |
| 161
H | 1247 | 2 ans
1/2 | M | I | | 21.11.70 | obnubil
pâleur
polypnée | opacités
floconneuses
base droite | Péni-Coli
Tanderil
Lavage
Gastrique | bonne | bonne | Sortie
+ 5 J |
| 162
A. | 1248 | 3 ans | M | I | | 14.11.70 | Examen
Normal | cliché
normal | Péni | bonne | bonne | Sortie
+ 1 J |
| 163
A. | 1328 | 4 ans | M | I | | 12.11.70 | Examen
Normal | cliché
Normal | Péni
H.H.C | bonne | bonne | Sortie
+ 4 J |
| 164
R. | 1119 | 3 ans | M | I | | 13.11.70 | hyperthermie
doul. abdom. | infiltration
bilat.
discrète | Péni-Coli
Tanderil | bonne | bonne | Sortie
+ 4 J |
| 165
S. | 1131 | 2 ans | M | I | | 17.11.70 | Examen
Normal. | opacités
micro nodul
des 2 bases | Péni
Phosphal | bonne | bonne | Sortie
+ 4 J |
| 166
R. | 1498 | 18 ans | M | I | | 14.11.70 | obnubilaton | opacités
marginales base
droite | Péni
Solnicol
H.H.C | bonne | nettoyage
progressif | Sortie
+ 8 J |
| 167
K. | 524 | 7 ans | F | I | | 10.5.70 | Examen
Normal | cliché
Normal | Péni
Terra | bonne | bonne | Sortie
+ 3 J |
| 168
H | 514 | 11 ans
1/2 | M | I | | 17.5.70 | EXAMEN
NORMAL | accentuation
opacités
broncho
Vascul. | Ti/O
Solt
Cortancyl | bonne | bonne | Sortie
+ 8 J |

| NP | N° | AGE | SEXE | Nat | Quité | Moment | Date | Etat clinique | cliché pulm | TRAITEMENT | EVOL CLIN. | EVOL Radiol | Issue |
|-----|-----------|--------|------|------|---------|---------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 169 | C... H | 26ans | F | Vol | | 15.5.70 | 16.5.70 | EXAMEN NORMAL | cliché NORMAL | O | bonne | RAS | Sortie +1J |
| 170 | M... K | 3ans | F | I | | k.j.m | 13.4.70 | obnubil. reste normal | cliché normal | Péni Phosphal | amélioration dyst. puis bonne | bonne | Sortie +4J |
| 171 | K... M | 2ans | M | I | | | 21.2.70 | Examen Normal | cliché normal | Péni Hexa | bonne | bonne | Sortie +1J |
| 172 | D... M. | 15mois | F | I | 10cc | | 8.6.70 | Polyptée rales bronch | cliché normal | Tifo | bonne | bonne | Sortie +1J |
| 173 | L... A... | M 2ans | I | 2ans | | 14.j.m | 23.3.70 | ENCOMBR. BR. | cliché NL | Péni Phosphal | bonne | RAS | Sortie +2J |
| 174 | B... M. | 14mois | M | I | 20cc | 14.j.m | 26.5.70 | hyperthermie | cliché NL | Tifo. Sult | bonne | RAS | Sortie +5J |
| 175 | L... A. | 2ans | M | I | | 10.7.70 | 17.7.70 | hyperthermie dyspnée | opacités hil. fuges. | Tifo | bonne | bonne | Sortie +3J |
| 176 | L... H. | 1an | F | I | 30cc | | 9.7.70 | rales bronch. base droite | opacités base droite | Bristojen | bonne | bonne | Sortie +7J |
| 177 | C... D | 2ans | F | I | | 6.7.70 | 7.7.70 | TOUX. DYSPN. deut. ABD. | opacités. stoc. base Dte. | Péni Tifo. Tandén | bonne | bonne | Sortie +7J |
| 178 | B... H. | 2ans | M | I | | | 31.1.70 | hyperth. Dyspn. rales base G. | opacités. bilat prédom. G. | Terra Tifo. | bonne | persistance 7j. anomalies | Sortie +9J |
| 179 | M... A. | 18mois | M | I | 1 verre | | 14.7.70 | Examen. NI | cliché NI. | Tifo. Sult. | bonne | bonne | Sortie +1J |
| 180 | M... M. | 3ans | M | I | | | 16.7.70 | Examen. NI. | opacités para-médiast. | Tifo Sult | bonne | bonne | Sortie +4J |

10

I

| N° | N° | Age | Sexe | Nat | Quitté | Moment | Date Entrée | Etat clinique Entrée | Radio pulm Entrée | Traitement | EVOL. CLIN. | EVOL. RADIOL. | Issue |
|-----|----------|------|---------|-----|--------|------------------|-------------|--|--|---------------------------|--|--------------------------|--------------|
| 181 | B... H | 3277 | ans | F | I | | 4.9.71 | râles bronch bilat. | cliché NI. | Solnicol H.H.C. | bonne | bonne | Sortie + 1 J |
| 182 | C... S. | 1810 | 2ans | M | I | | 31.5.71 | Tachycardie | opacités. nuag. bilat. diffuses tr D & C | Péni-Coli H.H.C. | bonne | bonne | Sortie + 3 J |
| 183 | E... C. | 1038 | 1an | M | I | | 31.5.71 | Obnubil hyperth. Dysp. | opacités floconneuses champ droit | Solnicol H.H.C. | bonne | bonne | Sortie + 3 J |
| 184 | H... N | 2035 | 1an 1/2 | F | I | 1er j m | 15.6.71 | DYSPOEE. RALES BRONCH. TACHY | opacités micro nodul. champ Gauche. | Péni H.H.C. | bonne | bonne | Sortie + 2 J |
| 185 | L... H. | 2092 | 1an 1/2 | F | I | 1/2verre | 16.6.71 | hyperthermie Polyphée | Argent. tronc broncho. Vasc. | TERRA. Phosphat. | bonne | bonne | Sortie + 3 J |
| 186 | S... N. | 2898 | 5ans | M | I | 1/2verre | 16.6.71 | hyperthermie | opacités floconneuses base droite | Rovamycine Cortaucyl | bonne | bonne | Sortie + 3 J |
| 187 | N... Y | 2896 | 2ans | F | I | 1/2verre | 16.6.71 | CAEMEN MORBIL | opacités peu étendue. kara- caré. D & C | Terra Phosphat Tandéil | bonne | bonne | Sortie + 3 J |
| 188 | A... K. | 197 | 2ans | F | I | | 17.7.71 | Pâleur. Dyspn. râles diffus. | cliché Normal | BRISTOPEN Solnicol H.H.C. | bonne | bonne | Sortie + 4 J |
| 189 | C... A. | 2450 | 10mois | M | I | 1/2verre 1er j m | 12.7.71 | Obnubil toux irritative râles bronch. bilat. | Images floconn. bilat. à prédom DROITE. | Terra Cortaucyl | hyperth. Dyspnée + cyanose crépitaants pendant 4 J | amélioration progressive | Sortie + 9 J |
| 190 | A.-T. E. | 722 | 10mois | M | I | 1/2verre 1er j m | 21.7.71 | AGITATION | Cliché Normal | Ti fo Sulf. | bonne | bonne | Sortie + 3 J |

1. *Adiantum* (L.) Sw.

10

100

1000

615
1854

[Faint handwritten notes]

1892

54

1845
1846
1847
1848

| N° | N° | AGE | SEXE | Nat | Quête | Moment | Date
Entrée | Etat clinique
Entrée | Radio. Ivmon.
Entrée | TRAITEMENT | Evolution
Clinique | Evolution
Radiol. | Issue |
|-----|------------|------|--------|-----|-------|--------|----------------|---------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--|-----------------|
| 191 | B...
M. | 736 | 4ans | M | I | | 25.7.71 | Toux.
Râles bronch | RAS | TERRA
TANDERIL | bonne | bonne | Sortie
+ 2J |
| 192 | K...
M. | 3926 | 3ans | M | I | | 12.1.71 | Examen NI. | Surcharge
hilaire peu
importante. | Rovamycin
Cortancyl | bonne | bonne | Sortie
+ 4J |
| 193 | Y...
A. | 1051 | 1an | M | I | 12J.m | 12.1.71 | obnubil.
reste NI. | infiltrat.
bilat. | Péni
Cortancyl | sédation
progressive | bonne | Sortie
+ 7J |
| 194 | H...
S. | 4468 | 2ans | F | I | | 20.1.71 | Examen Normal | opacité
para médiast
Dte. | Péni
Solnicol | bonne | bonne
en 8J | Sortie
+ 9J |
| 195 | H...
R. | 3410 | 7ans | M | I | | 14.12.71 | Examen Normal | cliché Normal | Terra
Cortancyl | bonne | bonne | Sortie
+ 2J |
| 196 | K...
K. | 3827 | 17mois | F | I | 12J.m | 19.9.71 | hyperth.
Dyspn. Légère | opacités
para-hilaires
+ à DROITE | PÉNI
HHC | bonne | nettoyage
en 4J | Sortie
+ 6J |
| 197 | B...
A. | 3704 | 21mois | M | I | | 30.9.71 | DYSPIÉE
DISCRÈTE | accentuation
DISCRÈTE TRAME | Péni
TANDERIL | bonne | bonne | Sortie
+ 4J |
| 198 | B...
L. | 3843 | 17mois | M | I | | 7.7.71 | DYSPIÉE
HYPERTH. | opacités
Floconneuses
bilat. | BRISTOPEN
SOLNICOL
HHC | lente
mais
favorable | extension
opacités
à tout thorax
Droit.
pneumothorax
Droit. 9J. | Sortie
+ 23J |
| 199 | O...
M. | 3100 | 1an | F | I | | 24.8.71 | obnubilation | RAS. | ROVA.
CORTANCYL. | bonne | bonne | Sortie
+ 5J |
| 200 | F...
F. | 262 | 3ans | F | I | | 3.7.71 | Tachycardie | Surcharge
hilaire Droite | PÉNI | bonne | bonne | Sortie
+ 3J |

| N° | N° | AGE | SEXE | NAT | Quitté | Moment | Date Entrée | Etat-clinique Entrée | Radio pulm. Entrée | Traitement | EVOL. CLINIQUE | Evol. Radiol. | Issue |
|-----|-------|------|---------|-----|--------|---------|-------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| 201 | H. N. | 2710 | 20 ans | M | I | 1er. M | 7.8.71 | odynémie hyperth. spec. à 6he. | opacité base Gauche peu dense | Péni | bonne | bonne | Sortie +2J |
| 202 | Z. K. | 7826 | 3ans | H | I | | 7.8.71 | obnubil. secret sibillant trach. | opacité hyaline base Droite | Péni | bonne | bonne | Sortie +2J |
| 203 | O. H. | 525 | 2ans | F | I | Averse | 24.5.71 | dyspnée hyperth. rates fins - bases | opacités discrètes para-hilaires | Solnicol H.M.C. | bonne | bonne | Sortie +4J |
| 204 | B. A. | 1793 | 4ans | F | I | 20cc | 24.5.71 | hyperth. Dysp. rates bruch. | opacités bilatérales | Tifo Sulf. | bonne | bonne | Sortie +4J |
| 205 | A. A. | 2426 | 3ans | M | I | | 14.7.71 | hyperth. Dysp. rates bruch. Tachycardie hépatomégalie | opacités floconneuses ++ Gauches cardiomégalie | Tifo. cort. Cédétanide Lasilix | persistance signes cardio-resp. 4J | nettoyage eu 10J | Sortie +15J |
| 206 | B. D. | 2097 | 2ans | M | I | Averse | 16.8.71 | hyperth. Dysp. cyanose rates bilat | opacités des 2 bases | Péni. Solnicol Tanderil | Dyspnée 3J. apyrétique 2J | nettoyage eu 5J | Sortie +8J |
| 207 | R. S. | 1408 | 2ans | M | I | Averse | 22.4.71 | hyperth. méteorisme abd. c. à br. tachycardie | Surcharge bilatérale bilat. Hépatocolie | Tifo Tanderil | bonne | bonne | Sortie +3J |
| 208 | B. M. | 2947 | 18 mois | F | I | | 18.8.71 | conséquence Altérée Sans plus. | cléché N1. | Péni H.M.C. | bonne | bonne | Sortie +2J |
| 209 | A. D. | 2438 | 1an | F | I | Averse. | 18.8.71 | obnubil. sub coma convulsions. | | Solnicol H.M.C. O ₂ | état égal Convulsif | | O.C.D +4heures |
| 210 | H. M. | 2408 | 1an 1/2 | M | I | | 30.8.71 | somnolence hyperth. | Surcharge | Hexac. Sulf. (C. M. M.) | bonne | bonne | Sortie +2J |

(C O N C L U S I O N
* = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = * = *

$$*_{**} = *_{**} = *_{**} = *_{**} = *_{**} = *_{**} = *_{**} = *_{**} = *$$

- Les différentes données de la littérature,
- Les données recueillies dans le Service de Réanimation d' l'hôpital d' El-Kettar, permettent de dégager les points suivants, concernant l'intoxication par le Pétrole Laminant :

1 / - SUR LE PLAN ETIOLOGIQUE:

- Il s'agit d'une intoxication, le plus souvent accidentelle, qui survient chez des enfants , et dont la fréquence est sous-estimée.

2 / - SUR LE PLAN CLINIQUE :

- Prédominance des signes respiratoires; le pronostic des complications pulmonaires demeurant bon d'une manière générale .

- La forme neuro-toxique, heureusement rare, est mortelle dans tous les cas . (2 fois).

3 / - SUR LE PLAN PATHOGENIQUE :

- Deux théories se dégagent , quant aux mécanismes des complications pulmonaires .

a) Théorie de l'Inhalation directe (Pneumonie d'Inhalation) .

b) Théorie de l'absorption digestive (Pneumonie d'élimination) .

.../...

4 / - SUR LE PLAN THERAPEUTIQUE:

- Le traitement des complications de cette intoxication ,comporte :

- LES ANTIBIOTIQUES.

- LES ANTI-INFLAMMATOIRES.

(Corticoides.)

- La Réanimation respiratoire
quant elle est nécessaire.

Et surtout, la prévention, par une éducation sanitaire
de masse .

II) I B L I O G R A P H I E

* * * * *

- 1 - ADDA R.
Intoxication par les pétroles.
Thèse Paris 1959 .
- 2 - ALBERT W.C. & INKLEY S.R.
Efficacité des stéroïdes dans le traitement de la
pneumonie expérimentale à kérosène.
Am. Rev. Resp. Dis., Nov. 1968, 98 .
- 3 - ASHKENAZI A.E. & BERMAN S.E.
Intoxication expérimentale au kérosène marque chez
le rat- Pédiatrics, Oct. 1961, 28, N° 4,642-649.
- 4 - BAGHDASSARIAN O.M., WEINER S.
Pneumatocele formation, complicating hydrocarbon
pneumonitis.
Am.J. Roentgenol. 1964 . 95 104/111 .
- 5 - BALDACHIN B.J. & MELMED R.N.
Aspects cliniques et thérapeutiques de l'intoxication
par le kérosène .
Série de 200 cas-Brit. Med.J., 4 juil. 1964,
N° 5400 - 28/30 .
- 6 - BEDOSSA R.
Intox. par ingestion accidentelle de pétrole chez
l'enfant.
Thèse Paris, 1964 .
- 7 - BERNARD R. & Coll.
Pneumopathies par ingestion de pétrole.
Marseille Méd. 1961 , 98, N° 2 .
- 8 - BERNHEIM M.
Les intoxications accidentelles et thérapeutiques chez
l'enfant Pédiatrie 1959 , 56 , N° 7 .
- 9 - BOLOGNA N.A. & WOODY N.C.
Kérosene poisoning. New-Orleans. Med.& Sc.J .Déc. 1948.
- 10 - BONTE F.J. & REYNOLDS J.
Hydrocarbon Pneumonitis. Radiology Sept. 1958-71. N°3 .

- 11 - BOST M. & Coll.
Les pneumopathies par ingestion de pétrole et de ses dérivés chez l'enfant.
Rev. Pédiatrie. 1969 . N° 1 .
- 12 - BOUCHER H., BERTEIN J., ROUMAGNAC & LOUP.
Arch. Mal. Proff. et Méd. Trav. 1951 N° 12 .
- 13 - BRUNNER S. & Coll.
Modifications radiologiques du poumon, chez l'enfant intoxiqué par kérosène.
Am. Rev. Resp. Dis., 1964 , N° 89 .
- 14 - BUTTARO C.A., SILVES TRI D., & TURCHETTI A.,
Pleuro-pneumopathie par benzolisme aigu dans l'intoxication accidentelle par le pétrole.
Minerva Med., 29 Sept. 1967, 58 , N° 78 .
- 15 - CACHIA E.A. et FENECH F.F.
Intoxication au kérosène chez l'enfant.
Arch. Dis. Child. Oct. 1964, 39 , N° 207 .
- 16 - CAMPBELL J.B.
Formation de pneumatocèle après ingestion d'hydrocarbures.
Am. Rev. Resp. Dis., Mars 1970, 101, N° 3 .
- 17 - CARUS J.
A propos de deux cas d'intox. au pétrole chez l'enfant .
Thèse Paris 1966 .
- 18 - CARRE J.C., BORDES F.P. et FREOUR P.
Les pneumopathies du pétrole chez l'enfant.
Poumon et Coeur, 1965, 21 , N° 4 .
- 19 - CASTEX M., COURVAIN J.C., FOULON E. et FAURE C.
Pneumopathies bulleuses par ingestion de pétrole .
J. Radiol. Electrol. Nov. 1970, 51 , N° 11 .
- 20 - CAUSSADE L., NEIMANN N., ST EHLIN et FERNIER .
Pneumopathies par ingestion de pétrole.
Pédiatrie, 1952 , 41 , N° 2 .

.../...

- 21 - CRAIG J.O., FRASER M.S.

Accidental Poisoning in Childhood.

Arch. Dis. Child. 1953 , 28 - 259 .

- 22 - CARRON R. FRANÇOIS R. RIEDWE G., SEBBAG M.

Statistiques des cas d'intoxication chez l'enfant traitées en 10 ans dans les services de pédiatrie des Hôpitaux de Lyon.

Rev. Lyonn. de Méd. 1962 , 11 , 91 .

- 23 - DALEMONT;

Le pétrole " que sais je" .

- 24 - DECOURT J. et SIBERTIN-BLANC.

Pleurésie consécutive à l'ingestion accidentelle de pétrole.

B.M. Soc. Méd. Hôp. Paris., Avril 1948, 64 , N° 12-13.

- 25 - DRESHER C.W. BLATTNER R.S. COLLIN S.V.P.

Hydrocarbon pneumonitis.

Ped. Clin. of North- Amer. Fév. 1957. 24 , N° 3.

- 26 - DEICHMANN W.B., KITZMILLER K.V. WHITERUPS S. et JOHANSMANN R.

Ann. Med. Int. Novembre 1944 , 21 .

- 27 - DERVILLICE P., DESOILLE H. , TRUFFERT L.

Intoxication par le pétrole. E.M.C. (Int.)

- 28 - DESCOEUDRES P.

Un cas de pleurésie aiguë par aspiration d'essence.

Rev. Med. Suisse Rom. Oct. 1940 , N° 12 .

- 29 - DIDIER R.

Syndrôme respiratoire consécutifs à l'aspiration accidentelle d'huile de pétrole. Considérations pathogéniques.

Arch. Franç. Péd. 1948 , N° 5 .

- 30 - M. DRIF , R. DAOUD, E.BENMATI.

A propos de l'Intoxication par le Pétrole Lampant .

Sté Médecine d'Alger .

.../...

- 31 - M. DRIF & COLL.
Considérations sur l'intoxication par le Pétrole Lampant
J. de Réanimation de Tunis 1970 .
- 32 - FOLEY J.C., DREYER N.B. et WOLL E.
L'intoxication par le kérosène chez le jeune enfant.
Radiology., Juin , 1954, 62 , N° 6.
- 33 - GAIBERT , RAFFALI et BALDE .
Kérosène Pneumonia.
Rev. Praticien, 11 Oct. 1957, 7 . N° 26 . 2896-2899.
- 34 - GEORGE B.
Intoxication par le pétrole (Rapport présenté à la réunion de l'association Britannique de Médecine Légale, le 25 Juin 1960, à Manchester.)
Bull. Méd. Lég., Mai 1963, 6 , N° 3 .
- 35 - GELFAND M.
Paraffin Pneumonia.
Brit. Med. Jour. Nov. 1944, 46 - 37 .
- 36 - GERBEAUX J., COUVREUR J., TOURNIER G. et LESAGE B.
Une cause rare de pneumatocele chez l'enfant :
l'ingestion d'hydrocarbures.
Ann. Méd. Int. Mai 1971, 122 , N° 5.
- 37 - GERSHON-COHEN J., BRINGHURST L.S. et BYRNE R.N.
Radiographie de l'intoxication par le pétrole. Pneumonie
Chimique. - Am. J. Roentgenol., av. 1953 , 69 , N° 4.
- 38 - GROSS P.M.C., NERNEY J.M.
Pneumonie par kérosène. Etude expérimentale avec de
faibles doses.
Am. Rev. Resp. Dis. Nov. 1963., 38 .
- 39 - GUIGNARD J., ROUSSEAU L. et LE GOUAS J.J.
Pneumopathies de l'enfant par ingestion de pétrole.
Arch. Franç. Péd., Fév. 1969, 26 , N° 26 .
- 40 - GWINN J.L. et BARNES G.R.
Cas radiologique du mois: Oedème pulmonaire et pneumonie chimique, après absorption de pétrole distillé .
Am. J. Dis. Child. Déc. 1965 , 110 , N° 6.

- 41 - HIEBEL J., GANT H.L., SCHWARTZ S.O. et FRIEDMAN I.I.
Dégénérescence de la moëlle osseuse après exposition au
kérosène.
Am. J. Méd. Sci., Août 1963 , 246 , N° 2 .
- 42 - HIGGINS J.M.
Rapidly fatal result a children from ingestion of kerosene
Pensylv. Méd. J., Apr. 1936 .
- 43 - LAVENSTEIN A.F.
Ingestion of kerosene, complicated by pneumonia, pneumo-
thorax, pneumo-pericarddium, and sub-cutaneous emphysema.
J. of Pédiatries., Apr. 1945 , 26 , N° 1 .
- 44 - LE GLUDIC H, et TURLAIS C,
Sur la toxicité du pétrole,-actions physiologiques.
- Ann. D'hygiène publique et de Médecine Légale
1944 . 81 .
- 45- LELONG M. et DEROUBAIX P.(Mme).
Les intoxications par les produits pétroliers, chez
l'enfant.
J. Med. Nord-Est, Déc. 1968 , 5 , N° 10 .
- 46 - McNALLY W.D.
L'intoxication par le kérosène chez l'enfant.
J. Péd. , Mars 1956 , 48, N° 3 .
- 47 - MOZICONACCI P., et ATTAL C.
Intoxication par le pétrole à symptomatologie neurolo-
gique.
Arch. Franç. Péd., 1955 , 12, N° 2 .
- 48 - NUNN J.A. , MARTIN F.M.,
Gasoline and kerosene poisoning in children .
J.A. MLA., 103 , 472 - 1934 .
- 49 - OLSTAD R.B. et LORD R.M.
Jr. Intoxication par le pétrole.
Am. J. Dis. Child., Avr. 1952 , 83 , N° 4 .

50 - PRESSE et Coll.

Etude de l'intoxi. par le kérosène. Appréciation de la valeur du lavage gastrique ainsi que d'autres facteurs dans le traitement de l'ingestion accidentelle de produits de la distillation des pétroles.

Pédiatries., Avr. 1962 , 29 , N° 4.

51 - REED E.S., LEIKIN S. et KERMAN H.D.

L'intoxication par le kérosène.

Am. J. Dis. Child., Avr. 1950 , 79 , N° 4 .

52 - RICHARDSON J.A. et PRATT-THOMAS H.R.

Action toxique de doses variables de kérosène administrées par différentes voies.

Am. J.Méd. Sci., Mai 1951, 221, N° 5 .

53 - RING R. et NELSON J.D.

Pneumonie par hydrocarbure chez le rat. Comparaison des toxicités de la cire à l'huile de phoque synthétique (pétrole) et du kérosène avec évaluation du lavage gastrique.

Arch.Environ. Health, Déc. 1966, 13 , N° 6.

54 - ROVIN SKY J., GASIGLIA-TUFFERT (Mme) et BACHELLERIE A.

Complications pleuro-pulmonaires au cours de l'intoxication par le pétrole chez l'enfant.

Pédiatrie, Juil.-Août 1968 , 23 , N° 5 .

55 - Sub-COMITTEE on accidental poisoning, kerosene poisoning study (Report.)

Pediatrics. 29 , 6 , 18, 1962 .

56 - STEINER M.V.

Syndrôme of kerosene poisoning in children.

Am.J. of . Dis. of Child. 1947 - 74 .

.../...

- 57 - TODOT F., BRYON P.A., PELLET J., SAURY A. et ROCHE L.
Fleuro pneumopathie par ingestion de pétrole. Evolution
Radiologique à type d'abcès pulmonaire.
Arch. Mal. Prof., Juin 1964 , 25 , N° 6 .
- 58 - TURPIN R. , CHASSAGNE P. et BOUVATTIER P.
Troubles de la ventilation pulmonaire, consécutifs à
l'ingestion de pétrole chez un nourrisson de 9 mois .
Sem. Hôp. Paris, 6 Juil. 1953, 29 , N° 45 .
- 59 - VACCARO R. et GENOVA R.
La cytologie pulmonaire par acupuncture dans un cas de
broncho-pneumonie dû au pétrole. Observations en fluores-
cence.
Minerva Ped., 11 Août 1964 , 16 , N° 23 .
- 60 - VARESSE L.A.
Intoxications aigües de l'enfant par le pétrole.
Minerva Ped., Déc. 1967 , 19 , N° 50 .
- 61 - WARING J.P.
Pneumonia in kerosene poisoning .
Amer. J. of. Med. Sc. 1933. N° 9 (cité par WOLFE.)
- 62 - WOLFE B.M., BRODEUR A.E. et SHIELDS J.B.
Le rôle de l'absorption gastro-intestinale de kérosène dans
la production de pneumonie chez le chien.
J.Péd., Juin , 1970, 76 , N° 6 .
- 63 - MAYAK R.L., BOZORGNIA N. et ZINSSER. H.F.
Kérosène pneumonitis treated with adrenal steroids
- 1/Ann. Int. Med. 1961, 54 .
- 2/Ann. Int. Med. Mai 1971 , 122, N° 5, 589/596 .

* * * * *

* * * *

* *

*

